

## PLANTEVÆRN



PLANTEVÆRN  
Kontakt: Jørgen P. Jensen  
jpjensen@effektivtlandbrug.dk  
40 41 76 84 - 63 38 25 26



# Varsling: Sprøjt mod Septoria i hvede

Registreringerne den 27. og 28. maj viser, at der i øjeblikket kun er lidt Septoria i hvede, men nedbør har alligevel udløst bekæmpelse.

I vinterhvede er der i øjeblikket kun lidt Septoria, men nedbør har udløst bekæmpelse i mange marker, oplyser Videncentret for Landbrug fra konsulenternes registreringsnet.

Fra og med vækststadium 32, som er to knæ udviklet, tælles antal dage med nedbør for at fastlægge behovet for bekæmpelse af Septoria.

I stadium 32 er tredje øverste blad ved at komme frem og kan smittes.

I de fleste af de dyrkede sorter udløser fire til seks dage med nedbør en bekæmpelse. I den mindre modtagelige sort Tabasco starter optællingen af dage med nedbør først i st. 37, hvor fanebladet er synligt.

## Sortsforskelle i modtagelighed

Det gennemsnitlige vækststadium er i øjeblikket 37, hvor fanebladet er synligt, mens de længst udviklede marker er i st. 43, hvor fanebladets bladskede svulmer, oplyser videncentret videre.

Hvor septoriabekæmpelse bliver udløst i vækststadium 33-37, anbefales omkring 30 procent dosis, og der anvendes



Septoria på hvede i juni. De sidste ugers nedbør har udløst behov for bekæmpelse flere steder. (Foto: Andreas Østergaard)

des under skridning en højere dosis.

Hvor bekæmpelse først udløses i st. 39, hvor fanebladet er fuldt udviklet, anbefales en delt aksbeskyttelse, hvor der afhængigt af sort og nedbør anbefales 25-40 procent dosis hver gang.

Af de mest udbredte sorter er Tabasco mindst modtagelig for Septoria, efterfulgt af Mariboss, Jensen og Tuareg, mens de øvrige sorter, herunder Hereford, er mest modtagelige.

## Bekæmpelsesforslag

Hvor der udløses en Septoriabekæmpelse i st. 33-37, foreslår videncentret, at der kan anvendes 0,45 l Bell, 0,45 l Viverda, 0,225 l Bell + 0,1 l Proline eller + 0,15 l Prosoaro, 0,15 l Rubric + 0,1 l Proline (eller + 0,15 l Prosoaro), 0,3 l Rubric/Maredo, 0,25 l Proline eller 0,4 l Prosoaro.

Hvor der udløses en Septoriabekæmpelse i st. 39, kan for eksempel anvendes 0,375-0,6 l Bell, 0,375-0,6 l Viverda, 0,2-0,3 l Bell + 0,1-0,15 l Proline el-

ler + 0,15-0,25 l Prosoaro, 0,15-0,2 l Rubric + 0,1-0,15 l Proline eller + 0,15-0,25 l Prosoaro.

Ved højest én af behandlingerne ved den delte aksbeskyttelse kan også anvendes 0,25-0,4 l Rubric/Maredo, 0,2-0,3 l Proline eller 0,3-0,5 l Prosoaro.

## Angreb i øvrige afgrøder

I vinterbyg og rug ses fortsat i denne uge meget skoldplet i en del marker, men i de fleste tilfælde kun lidt i vinterbygssorten Matros.

I triticalesorten Gringo er der fundet gulrust i cirka 35 procent af markerne.

I vårbyg er fundet enkelte tilfælde af meldug i sorten Propino. I havre er der ikke fundet meldug.

De første få aflæsninger af fangster af hvedegalmyg i feromonfælder er foretaget. Der er dog ingen flyvning. Hveden er først modtagelig fra begyndende skridning.

I rajgræs er der fundet kronrust i knap 20 procent af markerne.



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.