



Naturerhverv.dk



Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Se 'European Agricultural Fund for Rural Development' (EAFRD)

Ugens angreb af skadegørere i korn og alm. rajgræs

■ I vinterhvede har septoria bredt sig den sidste uges tid på lokaliteter med tidligere meget nedbør. Der er fundet gulrust i fire tilfælde i sorten JB Asano, og der er begyndende angreb af bladlus.

Det oplyser Videntcentret for Landbrug i den ugentlige indberetning fra landets planteavlsskonsulenter til det såkaldte registreringsnet.

I vinterbyg er svampebekæmpelse nu kun aktuel i meget sent udviklede marker.

I rug er det aktuelt at holde øje med brunrust en uges tid endnu.

Der er fundet brunrust på fem procent af lokaliteterne.

I tritcale er gulrusten gået lidt i stå, hvilket måske kan skyldes en form for voksenplanteresistens. Svampbekæmpelse i tritcale skal nu til at afsluttes.

I vårbyg er der udløst meldugbekæmpelse i 15 procent af markerne med sorten Propino. Skoldplet har bredt sig i nogle marker. Der er bladlus og kornbladbillelarver i flere marker. Der er ikke fundet bygrust.

I havre er der ikke fundet meldug. Der er bladlus og kornbladbillelarver i flere marker.

Der er fundet hvedegalmyg over tærsklen i én af cirka 60 marker. I knap 20 procent af markerne var der over 30 hvedegalmyg pr. fælde pr. dag.

I rajgræs er der fundet kronrust i cirka 20 procent af de usprøjtede marker, og angrebene er relativt svage med op til 5 procent dækning.



Der er nu indberetninger om begyndende bladlus i hvede. (Foto: Videncentret for Landbrug)

jpj

Pletvingefrugtfluen er et nyt frygtet skadedyr i Europa

■ Det er sjældent, at et nyt skadedyr får så massiv omtale, som pletvingefrugtfluen får, oplyser Videncentret for Landbrug.

I alle europæiske frugtavlstidsskrifter får det frygtede skadedyr massiv omtale. Den er primært skadegører i blåbær, jordbær, hindbær, kirsebær, blommer, brombær og druer, men kan også findes i æbler, pærer og flere andre.

ipj

Anbefaling omkring brug af Viverda

■ På basis af henvendelser fra landmænd og konsulenter, har BASF undersøgt problemet omkring Viverda med tilslemning af linie- og dysefiltre.

Firmaet har derfor lavet en række undersøgelser ved Agrolab, og er kommet frem til:

- Tilsætning af 0,5-1,0 liter ammonium sulfat (svovlsur ammoniak) pr. 100 liter vand reducerer risiko for udfældning i linie- og dysefiltre.
- Ved opblanding hældes først ammonium sulfat i sprøjtevæskan, dernæst Viverda og til sidst en evt. blandingspartner.
- Ved genopfyldning af sprøjten bør linie- og dysefiltre altid efterses for belægninger. Hvis der findes begyndende tilslemning, renses filtrene med et egnet rengøringsmiddel som for eksempel All Clear Xtra før sprøjtearbejdet genoptages. Den hvide belægning er let at fjerne.

jpj

Dispensation til senere anvendelse af Opera i majs

■ Miljøstyrelsen har den 3. juni givet dispensation til anvendelse af Opera i majs indtil vækststadium 65, som er fuld blomstring.

Opera er ellers kun godkendt til anvendelse indtil vækststadium 51, hvor hanblomsterstanden er mærkbar, men ikke synlig.

Afstandskravet til vandmiljøet er 20 meter.

Dispensationen gælder også suktermajs.

jpj