

PLANTEVÆRN

Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og FiskeriDen Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne

Naturerhverv.dk



Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Se 'European Agricultural Fund for Rural Development' (EAFRD)

Lørdag den 31. august 2013

Bladlus om efteråret kan give havrerødsot om foråret

Såning af vintersæd før 15.- 20. september giver større risiko for angreb af havrerødsot i foråret.



Alle vintersædsarter kan angribes af havrerødsot, men angreb er oftest kun mindre udbredt i rug og triticale, påpeger landskonsulen Ghita Cordsen Nielsen.

Ved fund af mange bladlus i vintersæd om efteråret kan der i tidligt såede marker være behov for at bekæmpe bladlus for at reducere smitten med havrerødsot.

Der findes dog ingen bekæmpelsestærskel for bladlus om efteråret i vintersæd, fordi et varierende antal bladlus indeholder smitte af havrerødsot.

- Har man meget let ved at finde bladlus, anbefales en bekæmpelse, såfremt marken er sået før 20.-25. september, siger hun.

Såtidspunktet har stor betydning

Jo tidligere såning, jo kraftigere angreb.

- Generelt ses de kraftigste angreb ved såning før cirka 15.- 20. september, påpeger Ghita Cordsen Nielsen.

Årsagen er, at bladlusene om efteråret søger attraktive værtplanter. Derfor er de tidligst fremspirede marker mest udsatte. Derudover har bladlusene længere tid til at overføre virusset i tidligt såede marker, før kulde sætter en stopper for deres aktivitet.

Risikoen for angreb af havrerødsot er størst i de mest milde områder af landet, fordi bladlusene her trives bedst.

Udbredelsen af havrerødsot i lokalområdet i tidligere år, blandt andet i 2007 (år med kraftige angreb), giver et godt billede af, hvor udsat ens område er.

Spildkorn kan give flere bladlus i efteråret

Jo mere grøn stubben er med spildkornsplanter eller græs, jo mere attraktiv er stubben for bladlusene.

Ved forfrugt frøgræs og anden græs vil der således ofte være flere bladlus i stubben. Roundup før høst og stubkultivering vil derfor begrænse risikoen for angreb i den efterfølgende vintersæd. Da bladlusene også kan komme flyvende til vintersæden, kan der dog selv uden en grøn stub komme kraftige angreb.

Milde efterår og vintre fremmer angreb, men da beslutning om evt. bekæmpelse ofte skal træffes fra omkring 2.-3.- bladstadiet, hvor vejrforholdene i resten af efteråret og vinteren ikke kendes, er det svært at inddrage denne faktor i sin vurdering.

jpi



Havrerødsot i vinterhvede. Angreb viser sig pletvis i marken, hvor væksten er lavere, og efterhånden bliver bladspidserne gule og rødlige. I hvede ses symptomerne typisk fra april-maj og ses ofte senere end i vinterbyg. (Foto: Videncentret for Landbrug)



Havrerødsot giver ofte rødlige bladspidser. (Foto: Videncentret for Landbrug)