

## Stadig ingen rapsjordlopper

Der er fortsat ikke fundet rapsjordlopper eller kun fundet meget få rapsjordlopper, oplyser Videncentret for Landbrug.

Der er udstationeret gule fangbakker på 60 lokaliteter i planteavlskonsulenternes registreringsnet for at følge forekomsten af rapsjordlopper og vurdere behovet for at bekæmpe angreb af rapsjordloppers larver.

- Bekæmpelse rettet mod bladnav i fremspiringsfasen kan ikke fastlægges via gule fangbakker, påpeger landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen. Bekæmpelse af bladnav anbefales frem til at cirka fire løvblade er udviklet, hvis der er over 10 procent bortnavet bladareal. Hold især øje med udviklingen i marker, hvor der er anvendt udsæd, der ikke er bejdset mod skadedyr. Noget af det sidst solgte udsæd er ikke bejdset mod skadedyr i år.

Bekæmpelse rettet mod larver anbefales, hvis der indenfor tre uger i alt fanges over 25 rapsjordlopper pr. fangbakke.

JPJ

Effektiv Landbrug

Nr. 161

7. september 2013

Ministeriet for Fødevarer,  
Landbrug og Fiskeri



Den Europæiske  
Landbrugsfond for Udvikling  
af Landdistrikterne



**Naturerhverv.dk**



Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Se 'European Agricultural Fund for Rural Development' (EAFRD)