



Registrering af rapsjordløpper uge 37

Der er pt. stadig kun meget få rapsjordløpper.


Der er udstationeret gule fangbakker på ca. 60 lokaliteter i planteavlskonsulenternes registreringsnet for at følge forekomsten af rapsjordløpper og vurdere behovet for at bekæmpe angreb af rapsjordløppers larver.

Der er pt. stadig kun meget få rapsjordløpper. I figur 1 nedenfor er udviklingen i år sammenholdt med udviklingen i tidligere år.

Bekæmpelse rettet mod bladnav i fremspiringsfasen kan ikke fastlægges via gule fangbakker. Bekæmpelse af bladnav anbefales frem til at ca. 4 løvblade er udviklet, hvis der er over 10 procent bortnavet bladareal. Hold især øje med udviklingen i marker, hvor der er anvendt udsæd, der ikke er bejdset mod skadedyr. Noget af det sidst solgte udsæd er ubejdset mod skadedyr i år.

Bekæmpelse rettet mod larver anbefales, hvis der indenfor 3 uger i alt fanges over 25 rapsjordløpper pr. fangbakke.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Figur 1. Fangster af rapsjordløpper i gule fangbakker i efterårene 2007-2013. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som du nuværende runde fangbakker).

Se [data og uddybende kommentar](#)

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.