



Hjem > Landdistriktsmidler > 2013 > Behovsbestemt bekæmpelse > **Nyt om skadegørere i registreringsnettet i korn, rajgræs, majs og sukkerroer i uge 28**

Nyt om skadegørere i registreringsnettet i korn, rajgræs, majs og sukkerroer i uge 28

Evt. bladlusbekæmpelse i korn skal afsluttes i denne uge i de sidste marker. Første registrering af svampesygdomme i majs er foretaget, og i upløjede marker med forfrugt majs er der i flere marker allerede meget majsøjeplet.

I **vinterhvede** er svampebekæmpelse ikke længere aktuel. Bladlusene har bredt sig meget i den forløbne uge. Den vejledende bekæmpelsestærskel for bladlus er frem til vækststadium 75 (alle kerner fuld størrelse, kerneindhold mælket og let grynet) 100 procent angrebne strå. Evt. bladlusbekæmpelse skal i de sidste marker afsluttes i indeværende uge. Ved vurdering af behovet skal også afgrødens "grønhed" inddrages, ligesom det skal vurderes, om aksene er helt sat til med bladlus eller der kun optræder få bladlus pr. aks.

I **vårbyg og havre** er svampebekæmpelse ikke længere aktuel. I sentudviklede marker skal evt. bladlusbekæmpelse afsluttes i denne uge.

I **rajgræs** er svampebekæmpelse afsluttet. Udviklingen af sortrust følges en uge endnu. Pt. er der ikke fundet sortrust. De fleste marker er dog tidligere sprøjtet mod svampesygdomme.

Majshalvmøl. Der er ikke fanget majshalvmøl.

Svampesygdomme i majs. Der er fundet meget majsøjeplet i 5 ud af 6 marker med reduceret jordbearbejdning og samtidig forfrugt majs, dvs. i "risikomarker". I markerne med angreb var 75-100 procent af planterne angrebne. I 13 pløjede marker blev der kun fundet angreb i 3 marker (1-5 procent angrebne planter). Bekæmpelse er aktuel i de første "risikomarker", når de er omkring 1 m høje.

Svampesygdomme i sukkerroer. De første registreringer foretages denne uge.


Nedenfor ses link til registreringerne og kommentarerne til de enkelte afgrøder samt fotos af majsøjeplet og gammauglen samt figur med bladlusudviklingen i vinterhvede.

NB: Dette var sidste registrering i vinterhvede, vårbyg og havre. Vi takker for indberetningerne.

Registreringerne i rajgræs fortsætter af hensyn til evt. sortrust en uge endnu.

I majs og sukkerroer er registreringerne af bladsvampe først lige begyndt.

- [Vinterhvede](#)
- [Vårbyg](#)
- [Havre](#)
- [Alm. rajgræs](#)
- [Majshalvmøl](#)
- [Svampesygdomme i majs](#)
- [Bladsvampe i sukkerroer](#)



Figur 1. Udviklingen af bladlus i vinterhvede i år i forhold til de to foregående år. Procent angrebne strå er vist.

Promilleafgiftsfonden for landbrug





Billede 1 og 2. Sprøjtemist uden tidligere sprøjtning med Mavrik. Området er mørkt grundet bladlusangreb. Fotograferet den 9. juli.
Foto: Carsten Kløcher, Djursland Landboforening.



Billede 3. Angreb af majsøjeplet på bladene i majsmark i registreringsnettet med forfrugt majs og pløjefri dyrkning fotograferet 5. juli. Omkring 75 procent af planterne var angrebne. Ved første øjekast kan det måske ligne en svidning, men holdes bladene op mod lyset ses de brune cirkulære pletter, som er omgivet af en gul rand. Foto: Hans Kristian Skovrup, Sønderjysk Landboforening.



Billede 4. Gammaugle. I de udstationerede feromonfælder har der flere steder forvildet sig nogle gammaugler ind i fælderne. Gammaugler kendes på gammategnet på vingerne.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.