

Hjem > Landdistriktsmidler > 2014 > Økologisk viden > Registrer rodokrudtet i juli og lav din strategi til at kontrollere det

Registrer rodokrudtet i juli og lav din strategi til at kontrollere det

Det er nu, du kan få overblik. Gennemgå dine marker nu i juli måned, hvor rodokrudtet for alvor bliver synligt og lav din strategi for bekæmpelsen.

Hvilken strategi du skal vælge, vil afhænge arten af rodokrudt der er tale om og eventuelt om der er tale om en blandet bestand.

Et fælles træk for alle strategier er, at des tidligere jordbehandlingen startes om sommeren, des større er chancen for succes.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'

Anbefalinger

Ved en massiv og blandet bestand af rodokrudt er den ultimative strategi minisommerbrak:

- Om foråret sås en vårsæd.
- Slæt eller afpudsning omkring 1. juni.
- Jorden holdes sort med gentagne harvninger med fuld gennemskæring i juni og juli måned.
- I slutningen af juli måned laves en god pløjning og der sås gul sennep eller olieræddike.
- Der pløjes igen til foråret og sås en konkurrencestærk vårsæd.

Hvis tidsler er hovedproblemet, er 2 x pløjning en effektiv strategi:

- Straks efter høst og inden 15. august pløjes der og sås gul sennep.
- Der pløjes igen til foråret og sås en konkurrencestærk afgrøde.
- Både strategier med minisommerbrak og slæt har vist sig effektive overfor tidsler, men også vingskærsharvninger har effekt, hvis der sættes ind tidligt efter høst.

Hvis kvik er hovedproblemet kan vingskærsharvninger og udtørring være effektivt:

- Straks efter høst laves der en jordbearbejdning med fuld gennemskæring.
- Der laves gentagne jordbehandlinger for at få kvikrødderne op på jordoverfladen til udtørring.
- Efterafgrøden skal sås inden 15. august for at være effektiv.

Hvis der er følfod på arealet:

- Følfod kan ikke bekæmpes effektivt på en vækstsæson og strategien skal konsekvent følges op året efter.
- Jordbehandlingen med fuld gennemskæring skal startes tidligst muligt efter høst og følges op med en forårsbehandling, hvor det vurderes, at følfod er mest følsom overfor afbrydelse af væksten.

Hvis der er agersvinemælk på arealet:

- Jordbehandlingen med fuld gennemskæring skal startes tidligst muligt efter høst.
- Jordbehandlinger efter den 1. september er i bedste fald spildte kræfter og risikoen for en opformering er stor.
- Minisommerbrak er effektiv over for agersvinemælk

Strategierne har været afprøvet i et toårigt forløb på både en lerjords- og sandjordsejendom, og her viste resultaterne, at minisommerbrak, som den eneste af de afprøvede strategier, effektivt har reduceret bestanden af alle rodokrudtsarter. Du kan læse mere om strategierne og hvilke effekter der blev opnået [her](#)



Gul sennep sået d.16. august efter pløjning giver god konkurrence til ukrudtet og holder på næringsstofferne. Billedet er taget d. 15. oktober. (Klik på billedet for stor udgave).

Fotograf: Lars Egelund Olsen, Videncentret for Landbrug, Økologi