




Sammenhæng mellem produktionsfaktorer og CV-tal i KIK

Slagtekyllingeflokkes vægtspredning (CV-tal) minimeres når kyllinger er efter yngre forældredyr og opnår en høj 34-dages vægt via dygtig driftsledelse (optimal fodring og pasning). Det viser KIK-databasen.

Efter en tilvænningsperiode vil CV-tallet blive ligeså vigtigt et produktionsparameter som foderudnyttelse, slutvægt, dødelighed og trædepude point. Den sikreste måde at bestemme CV-tal er på slagtetidspunktet. Det gavner slagtekyllingebusinessens konkurrenceevne, at slagterierne er begyndt at oplyse CV-tal til deres kyllingeproducenter.

Mange kyllingeproducenter undersøger hvilket hvedeprogram, der er mest optimalt for dem at anvende til slagtekyllingerne. Hvis man inddrager CV-tallet i den beslutning, kan det være, man slet ikke vil anvende egen hvede til kyllingerne. Som det ses i figuren, viser KIK-data en tendens til at CV-tallet er lavere for flokke der ingen hvede har fået sammenlignet med dem, der har fået 10 % eller mere hel hvede. Man skal dog huske, at hvis foderets aminosyreindhold er for lavt, vil CV-tallet øges. Det kan derfor ikke udelukkes, at der er andre faktorer ved foderets sammensætning end hvedeprocenten, som har påvirket CV-tallet.



Figur 1. Sammenhæng mellem % hel hvede og CV-tal. KIK-data fra 18 tilfældige producenter, der havde afsluttet rotation 7 i 2014 den 20. oktober 2014 (klik på figuren for stor udgave).

Læs artiklen "[Årsager til variation i slagtekyllingeflokkes vægt - sammenhæng mellem produktionsfaktorer og CV-tal i KIK](#)"

Fjerkræafgiftsfonden



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'