



FOTO: TOMAS B. F. NØRFELT, SEGES

Faktaark

GØDSKNING AF ØKOLOGISK RAJGRÆS TIL FRØ

GYLLEANALYSE

Der er udbytte at vinde ved at kende det nøjagtige indhold af NH₄ i gyllen til frøgræsmarken. En kemisk gylleanalyse giver dig mulighed for at dosere mængden af kvælstof, og du undgår at underforsyne afgrøden.

DÆKSÆD

Vårsæd fungerer udmærket som dæksæd til frøgræsudlægget. Hestebønne og særligt grønært egner sig også godt som dæksæd. Her er fordelene, at dæksæden ikke konkurrerer om kvælstof, og udlægget får gode lysbetingelser tidligt, hvor grænarten er høstet og hestebønnerne åbner op for lysindfald ved modning.

GYLLE TYPE

Valg af gylletype er ikke afgørende, så længe man gøder efter NH₄-indholdet ved kemisk analyse. Ved meget lavt gødningsniveau er svinegylle dog at foretrække. Gylle fra mink og biogasgylle kan også anvendes.

NEDFÆLDNING/SLANGER

Nedfældning af gylle giver klart den bedste udnyttelse af kvælstof. MEN pas på køreskader!! Er der ikke udsigt til at kunne nedfælde inden 1. april, kør der i med slangeudlægger. Det er også muligt at slangeudlægge den første del af gyllen og nedfælde resten 2-3 uger senere, når forholdene tillader det.

	50 kg NH ₄	100 NH ₄	150 NH ₄
Nedfældet svinegylle	😡	😊	😄
Nedfældet kvæggylle	😡	😊	😄
Slangeudlangt svinegylle	😞	😡	😊
Slangeudlagt kvæggylle	😞	😡	😊





Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri



Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne

Naturerhverv.dk



Danmark og Europa investerer i landdistrikterne


Se 'European Agricultural Fund for Rural Development' (EAFRD)





FOTO: TOMAS B. F. NØRFELT, SEGES

> **FORVENTET UDDBYTTET DÆKSÆD KORN**



Forventet udbytte på baggrund af økologiske gødningsforsøg. Gennemsnit for kvæggylle, svinegylle samt dato for tildeling. For mere information henvises til oversigten over landsforsøgene 2014.

AFPUDSNING

Har man problemer med stort ukrudt fx kamiller, kan en afpudsning, inden rajgræsset har nået std. 30, give frøafgrøden et forspring. Ved afpudsning er det vigtigt, at knive og modskær er i rigtig god stand, og der køres langsomt. Ellers har afpudsning ringe effekt.

TO-DELT GØDSKNING

Det er muligt, at dele gødning og køre ud af to omgange. Det kan være nyttigt, hvis gyllen er meget tynd, eller man ønsker at give første halvdel meget tidligt med slanger og nedfælde det sidste, når jorden kan bære. Afstanden fra første til anden gødsning bør ikke overskride 3 uger.



KONTAKT

Lars Egelund Olsen, plantekonsulent
Økologi
leo@seges.dk
D +45 8740 5213



Darran A. Thomsen, plantekonsulent
Økologi
dat@seges.dk
D +45 8740 6668