



[Hjem](#) > [Landdistriktsmidler](#) > [2014](#) > [behovsbestemt bekæmpelse skadevoldere](#) > **Registrering af rapsjordløpper uge 36**

Registrering af rapsjordløpper uge 36

Der er nu en stigende forekomst af rapsjordløpper i mange marker, men i næsten alle tilfælde under bekæmpelsestærsklen for larveskade. Behovet for bekæmpelse af bladangreb skal man se sig til. De seneste dage er meldt om tilfælde af kraftige bladangreb.

Der er udstationeret gule fangbakker på ca. 80 lokaliteter for at følge forekomsten af rapsjordløpper og vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordløppers larver.

Der er nu en stigende forekomst af rapsjordløpper i mange af markerne, men i næsten alle tilfælde under bekæmpelsestærsklen. Det solrige vejr har øget antallet. Bekæmpelse rettet mod larver anbefales ved en samlet fangst på 25 rapsjordløpper pr. fangbakke indenfor 3 uger i hovedflyvningsperioden forudsat, at æglægningen er begyndt. Æglægningen begynder cirka 10 dage efter indflyvning til marken.

Bekæmpelse rettet mod de voksne rapsjordløppers bladgnav i fremspiringsfasen kan ikke fastlægges via gule fangbakker. Bekæmpelse rettet mod bladgnav skal man derfor se sig til. Bekæmpelse af bladgnav anbefales frem til at ca. 4 løvblade er udviklet, hvis der er over 10 procent bortgnavet bladareal. Vær i år særlig opmærksom på evt. tidlige angreb, da rapsudsæden i år ikke er bejdset mod skadedyr eller er bejdset med midler med relativ svag effekt.

I år har der hidtil været relativ få henvendelser om bladangreb, men denne uge er modtaget flere henvendelser om relativ kraftige angreb i nogle marker. Følg derfor udviklingen med udsigt til varmt og tørt vejr.

Se [data og uddybende kommentar](#).

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'