



Registrering af rapsjordløpper uge 38

Der er i år flere rapsjordløpper end i de foregående 5 år.

Der er i registreringsnettet udstationeret gule fangbakker på ca. 80 lokaliteter for at følge forekomsten af rapsjordløpper og vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod rapsjordløppers larver.

Bekæmpelse rettet mod larver anbefales ved en samlet fangst på 25 rapsjordløpper pr. fangbakke indenfor 3 uger i hovedflyvningsperioden, forudsat at æglægningen er begyndt. Æglægningen begynder cirka 10 dage efter indflyvning til marken. I de senest såede marker er indflyvningen sket senere, og optællingen starter derfor også senere.

Der er stor variation i fangsterne. Pt. er tærsklen for bekæmpelse rettet mod larver overskredet på ca. 30 procent af lokaliteterne. I figur 1 kan forekomsten i år sammenlignes med tidligere år. Det fremgår, at der i år er flere rapsjordløpper end i de foregående 5 år.

Pyrethroiderne Karate (0,2 kg pr. hektar), Kaiso Sorbie (0,1 kg pr. hektar), Nexide CS (0,06 liter pr. ha), Cythrin 500 (0,04 liter pr. ha) og Cyperb 100/100 W (0,2 liter pr. ha) er godkendt til bekæmpelse af rapsjordløpper. Med de nye afgifter er Karate og Kaiso Sorbie billigst. Der er kun få erfaringer med nedsatte doser. Ved mange rapsjordløpper og en lang flyveperiode kan der være behov for to behandlinger rettet mod larveangreb.


Der er en vis fleksibilitet i tidspunktet for bekæmpelse rettet mod larveskade. Bekæmpelse rettet mod larver kan iværksættes fra omkring 3-4 løvblade er udviklet.

Bekæmpelse rettet mod de voksne rapsjordløppers bladgnav i fremspiringsfasen kan ikke fastlægges via gule fangbakker. Bekæmpelse rettet mod bladgnav skal man derfor se sig til. Bekæmpelse af bladgnav anbefales frem til at ca. 4 løvblade er udviklet, hvis der er over 10 procent bortgnavet bladareal. Vær i år særlig opmærksom på evt. tidlige angreb, da rapsudsæden i år ikke er bejdset mod skadedyr eller er bejdset med midler med relativ svag effekt.

Der er fra praksis modtaget meget varierende meldinger om angrebsstyrken af bladgnav. Der er meldt om både meget svage og meget kraftige angreb, så det er nødvendigt at undersøge markerne for bladgnav i de tidlige vækststadier.

Se [data og uddybende kommentar](#).

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Figur 1. Fangster af rapsjordløpper i gule fangbakker i efterårene 2008-2014. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som du nuværende runde fangbakker).

Kontakt din **lokale rådgivningsvirksomhed**, hvis du vil vide mere om dette emne.