



Registrering af rapsjordlopper uge 39

Der er pt. udløst bekæmpelse rettet mod larver på ca. 45 procent af lokaliteterne.

Der er i registreringsnettet udstationeret gule fangbakker på ca. 80 lokaliteter for at følge forekomsten af rapsjordlopper og vurdere behovet for bekæmpelse rettet mod *rapsjordloppers larver*.

Bekæmpelse rettet mod larver anbefales ved en samlet fangst på 25 rapsjordlopper pr. fangbakke indenfor 3 uger i hovedflyvningsperioden, forudsat at æglægningen er begyndt. Æglægningen begynder cirka 10 dage efter indflyvning til marken. I de senest såede marker er indflyvningen sket senere, og optællingen starter derfor også senere.


Der er stor variation i fangsterne. Indtil videre er tærsklen for bekæmpelse rettet mod larver overskredet på ca. 45 procent af lokaliteterne. I figur 1 kan forekomsten i år sammenlignes med tidligere år. Angrebene pt. ligger på niveau med efteråret 2009, men ligger noget lavere end i efteråret 2008.

Pyrethroiderne Karate (0,2 kg pr. hektar), Kaiso Sorbie (0,1 kg pr. hektar), Nexide CS (0,06 liter pr. ha), Cythrin 500 (0,04 l pr. ha) og Cyperb 100/100 W (0,2 liter pr. ha) er godkendt til bekæmpelse af rapsjordlopper. Med de nye afgifter er Karate og Kaiso Sorbie billigst. Der er kun få erfaringer med nedsatte doser. Ved mange rapsjordlopper og en lang flyveperiode kan der være behov for to behandlinger rettet mod larveangreb.

Der er en vis fleksibilitet i tidspunktet for bekæmpelse rettet mod larveskade. Bekæmpelse rettet mod larver kan iværksættes fra omkring 3-4 løvblade er udviklet.

Bekæmpelse rettet mod *de voksne rapsjordloppers bladgnav* i fremspiringsfasen kan ikke fastlægges via gule fangbakker. Bekæmpelse rettet mod bladgnav skal man derfor se sig til. Bekæmpelse af bladgnav anbefales frem til at ca. 4 løvblade er udviklet, hvis der er over 10 procent bortgnavet bladareal. Vær i år særlig opmærksom på evt. tidlige angreb, da rapsudsæden i år ikke er bejdset mod skadedyr eller er bejdset med midler med relativ svag effekt.

Se [data og uddybende kommentar](#).



Figur 1. Fangster af rapsjordlopper i gule fangbakker i efterårene 2008-2014. For at kunne sammenligne tallene over årene er alle fangster omregnet til fangster i firkantede fangbakker (er ca. dobbelt så store som du nuværende runde fangbakker).

Kontakt din **lokale rådgivningsvirksomhed**, hvis du vil vide mere om dette emne.

Promilleafgiftsfonden for landbrug

