

Hjem > Landdistriktsmidler > 2014 > Formidling og demonstration ny viden > **Bladlus i majs**

Bladlus i majs

Bekæmpelse anbefales, hvis der er bladlus på alle planter, og der er kolonidannelse på mange af planterne.

De seneste dage er meldt om flere tilfælde af mere udbredte angreb af bladlus i majs.

Beslutning om evt. bekæmpelse skal træffes, før afgrøden er for høj at køre i. Bekæmpelse anbefales, hvis der er bladlus på alle planter, og der er begyndende kolonidannelse på mange af planterne.

Der findes ikke nyere forsøg med bladlusbekæmpelse i majs. Ældre orienterende forsøg viser, at der skal være i størrelsesordenen flere hundrede bladlus pr. plante, før bekæmpelse vil være rentabel.

Til bekæmpelse af bladlus i majs er kun Cyperb 100/100 W og Cythrin 500 tilladt, og en dosering på 0,2 l/ha hhv. 0,04 l/ha anbefales.

Vær opmærksom på, at der også før blomstring kan forekomme bier i marken, der søger honningdug fra bladlusene. Sprøjt derfor udenfor biernes flyvetid (ca. kl. 21-03).

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'



Billede 1. Kraftige angreb af bladlus. Der er ofte flest bladlus i marken, hvor der er læ.
Foto: Lars Møller-Christensen, Vestjysk Landboforening.



Billede 2. Nærbillede af bladlus. Foto: Lars Møller-Christensen, Vestjysk Landboforening.

Kontakt din **lokale rådgivningsvirksomhed**, hvis du vil vide mere om dette emne.