

Hjem > Landdistriktsmidler > 2014 > Formidling og demonstration ny viden > Golde småaks i vinterbyg

Golde småaks i vinterbyg

Nattefrost og store temperaturforskelle mellem nat og dag kan fremkalde symptomerne med golde småaks.

I flere vinterbygmarker ses nu mere eller mindre udbredt golde småaks, som især er tydelige i modlys.

Sen nattefrost, når aksanlæggene dannes i april, angives ifølge tyske kilder at kunne give de symptomer, som på tysk også kaldes "Laternen-krankheit".

Store temperaturforskelle mellem dag og nat f.eks. fra 25 °C til 10 °C, når fanebladet er udviklet, angives også at kunne fremkalde symptomerne.

Det er svært at angive sortsforskelle, da kulde på et givet vækststadium er afgørende for symptomernes omfang.

Erfaringsvis bliver nogle af småaksene senere bestøvet, og symptomernes betydning bliver tit overvurderet. Sæt evt. en pind ved nogle af aksene og iagttag løbende kernesætningen.



Billede 1. Bygaks med gennemskinnelige småaks. Foto: DL Syd.

Kontakt din **lokale rådgivningsvirksomhed**, hvis du vil vide mere om dette emne.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'