

Hjem > Landdistriktsmidler > 2014 > Formidling og demonstration ny viden > Stankelbenlarverne forpupper sig tidligt i år

Stankelbenlarverne forpupper sig tidligt i år

Det vurderes, at forpupningen i år vil ske 10-14 dage før end normalt, dvs. at aktiviteten forventes at ophøre omkring 20.-25. maj

Som bekendt optræder der i år kraftige angreb af stankelbenlarver en del steder. Se også [plantenyt nr.980, 2014](#).

Stankelben forpupper sig normalt omkring Sankt Hans, og aktiviteten aftager omkring Grundlovsdag. Grundet den milde vinter og forår forpupper larverne sig tidligere end normalt i år. Skadedyrseksperten oplyser, at forpupningstidspunktet er styret af den opnåede mængde varme (temperatursum). De vurderer derfor, at forpupningen i år vil ske ca. 10-14 dage før end normalt, dvs. at aktiviteten forventes at ophøre omkring 20.-25. maj, så der her kan sås en ny afgrøde. Majs er normalt ret robust for angreb og kan sås tidligere, hvis der ikke er meget kraftige angreb af stankelben.

Stankelbenets æglægning i efteråret strækker sig over ca. 3 uger, så der er forskellige larvestørrelser. Se også billede 1. Når stankelbenlarverne forpupper sig, har puppen samme farve og størrelse som larven, men forrest på puppen ses vingeanlæg. Se figur 1. Larverne forpupper sig i ca. 10 cm's dybde.

På nuværende tidspunkt flyver der andre arter af stankelben (Tipula-arter), men der er ikke tale om den stankelbenart, der skader landbrugsafgrøder.


Promilleafgiftsfonden for landbrug



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'



Billede 1. Forskellige størrelser af stankelbenlarver fotograferet for ca. 2 uger siden.



Figur 1. Larve og puppe af stankelben.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.