

Hjem > Landdistriktsmidler > 2014 > Formidling og demonstration ny viden > Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i hestebønner

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i hestebønner

Chokoladeplet og bedebladlus er de væsentligste skadevoldere i hestebønner.

Hestebønner kan angribes af chokoladeplet, hestebønnebladplet og rust. Angrebene af chokoladeplet og hestebønnebladplet kan i nogle år blive voldsomme, hvis det er fugtigt, og angrebet kommer tidligt. Evt. angreb af rust optræder ofte så sent, at det ikke har betydning.

I nogle år kan angreb af bedebladlus i hestebønner også være meget tabsvoldende. Der kan også være behov for at bekæmpe bladrandbiller i fremspiringsfasen.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Bekæmpelse af svampesygdomme

Amistar og **Signum WG** er godkendt til såkaldt "mindre anvendelse" (tidligere "off-label" godkendelse) i hestebønner. Amistar og Signum WG har begge godkendelse til bekæmpelse af chokoladeplet og hestebønnebladplet, og Signum WG har også en godkendelse til bekæmpelse af bønnenrust. Det er ved "mindre anvendelse" en betingelse for anvendelsen, at brugeren er i besiddelse af en vejledning. Denne kan f.eks. udprintes fra [middeldatabasen](#).

Svampebekæmpelse kan være aktuel omkring blomstring i meget fugtige år. Anvend omkring 0,5 l/ha Amistar eller 0,5 kg/ha Signum WG, da effekten kun er moderat. Der kan evt. også anvendes to behandlinger med 0,3-0,35 l/kg med 10-14 dages mellemrum omkring blomstring. Vær dog opmærksom på, at Signum WG kun må anvendes 1 gang pr. vækstsæson.

Bekæmpelse af bedebladlus

Bekæmpelsestærsklen for bedebladlus er 10-15 pct. planter med bladlus og begyndende kolonidannelse.

Pirimor G og **Karate 2,5 WG** er godkendt til bekæmpelse af bedebladlus. Pirimor G må maks. anvendes 1 gang pr. vækstsæson, og Karate 2,5 WG må maks. anvendes 3 gange pr. vækstsæson. Ved behov anvendes der 0,2-0,25 kg/ha Karate 2,5 WG eller 0,15-0,2 kg/ha Pirimor G. Anvendelse af Pirimor giver den bedste synlige effekt og foretrækkes ved mere udbredte kolonidannelser.

Der anbefales relativ høje vandmængder, omkring 200 l/ha, ved bekæmpelse af bladlus.



Billede 1. Bedebladlus i hestebønner.

Kontakt din **lokale rådgivningsvirksomhed**, hvis du vil vide mere om dette emne.