



Hjem > Landdistriktsmidler > 2014 > Formidling og demonstration ny viden > Uglelarver i frøgræs, korn og majs

Uglelarver i frøgræs, korn og majs

Der er i år i flere tilfælde modtaget henvendelser om angreb af hvidaksugler eller frøgræsugler i korn, frøgræs og majs.

Oftest er der tale om meget svage men iøjnefaldende angreb. Larvernes gnav giver anledning til hvidaks og visne planter. Der er ingen muligheder for bekæmpelse.

Hvidaksuglen forpupper sig normalt omkring slutningen af maj-begyndelsen af juni og frøgræsuglen omkring juni-juli. I år er det nok omkring 2 uger før. Æggene lægges på græs i august-september, og larverne overvintrer.

Larverne er omkring 3 cm i udvokset tilstand. Uglelarver har gangvorter og forrest ses ben. Farven kan variere, men frøgræsuglen er rødbrun, og hvidaksuglen er lysegrøn med mere eller mindre tydelige rødlige længdestriber.

Se billede 1-2.

I majs kan der også optræde en anden ugleart nemlig kartoffelborerens larve, der er violet, og som heller ikke kan bekæmpes. Se billede 3.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'



Billede 1. Hvidaksugle, som er på vej ind i hvedestrå. Bagenden ses.
Foto: Lars Andreasen, LandboLimfjord.



Billede 2. Frøgræsugle.



Billede 3. Kartoffelborens larve.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.