

Hjem > Landdistriktsmidler > 2014 > Formidling og demonstration ny viden > Ukrudtsbekæmpelse i græsmarker

Ukrudtsbekæmpelse i græsmarker

Forebyg at ukrudtet breder sig på permanente græsarealer og på arealer med græs i omdrift. Arealer skal leve op til Promilleafgiftsfonden for landbrug plantede kravene, hvis de danner grundlag for det støtteberettigede areal.

Arealer med permanent græs og græs i omdrift er støtteberettigede til Enkeltbetaling, hvis:

- mindst 50 pct. af jordoverfladen, ethvert sted på arealet, er dækket med græs eller andet grøntfoder, dog med en bagatelgrænse på 100 m²
- arealerne er så tørre, at de kan afgræsses eller udnyttes til slæt
 - i perioden 1. juni til 31. august for permanente græsarealer
 - i perioden 15. maj til 15. september for arealer med græs i omdrift
- kravet om udnyttelse ved slåning eller afgræsning i perioden 1. juli til 15. september opfyldes hvert år.



På lavtliggende arealer vil en plantebestand af græsser/foderplanter, der lever op til kravene, normalt ikke kunne opretholdes ved ekstensiv græsning, men kræver en udnyttelse med en vis intensitet og en passende pleje, hvor afpudsning vil være en vigtig foranstaltning.

Vær opmærksom på, at f.eks. vådbundsplanter og stive græsser/vækster som fx marehalm ikke regnes som foderplanter, og at arealer med 50 pct. eller mere af disse arter derfor ikke kan medregnes som støtteberettiget.

Ukrudt i vedvarende græs- og kløvergræs

I ældre, varige marker, hvor der afgræsses kan der være behov for en indsats mod ukrudt. Den mest effektive pleje består i at der gennemføres et eller flere slæt eller afpudses så græsser ved hurtig genvækst får fortrin frem for lysesiv, mosebunke, brandbæger, tidsler, stor nælde og andre ukrudsarter.

De fleste græsmarker kan "rettes op" gennem intensiv pleje. Hvor afgræsning/slæt ikke er tilstrækkeligt, kan det være aktuelt at foretage kemisk eller mekanisk bekæmpelse. En kraftig ukrudtsbestand af fugegræs og stor nælde er tegn på overgødsning med kvælstof på varige græsarealer. Det ses ofte i de områder, hvor dyretætheden er størst, dvs. nær ledåbninger eller foderpladser.

Kemisk ukrudtsbekæmpelse

Se forslag til løsninger for [græs](#) og [kløvergræs](#).

Oversigt over midler og sprøjtefrister

Middel	Afgrøde	Tidspunkt	Behandlingsfrist
Eagle	Græs/kløvergræs	Forår (på forbudsliste fra 1. maj 2014)	21 dage
Harmony SX	Græs/kløvergræs	Kun sensommer, aldrig i begyndelsen af vækstperiode (senest 31. august)	14 dage
Fighter 480	Græs/kløvergræs	Forår	14 dage
Primus	Græs	Forår	7 dage
Tomahawk/Lodin/Starane 180/Fluxpyr 200 EC	Græs	Forår	14 dage
Starane XL	Græs	Forår	14 dage
Ariane FG S	Græs	Forår (ikke senere end 1. august)	30 dage

Græs uden kløver

Bekæmpelse udføres, hvor det er tilladt, når græs og ukrudt er i god vækst i april til først i maj eller udføres på ny genvækst efter afhugning i eftersommeren. Skræpper, tidsler, stor nælde og andet rod ukrudt skal være 15-25 cm høje, så saftstrømmen transporterer aktivstoffet ned i rødderne. Det kan være nødvendigt at gennemføre bekæmpelse af rod ukrudt to år i træk. Vår- og engbrandbæger bekæmpes bedst sidst i august, hvor de nye planter er spiret frem.

Græs med kløver

Bemærk at eventuelle lagre af Eagle senest må anvendes i april 2014. Firmaet har afmeldt midlet og restlager må lovligt anvendes indtil 1. maj 2014, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud. I foråret hæmmer Harmony SX græsvæksten. Derfor skal midlet anvendes i juli/august. Der sprøjtes på genvækst 2-3 uger efter afpudsning eller afgræsning. Vår- og engbrandbæger bekæmpes sidst i august, hvor de nye planter er spiret frem.

Midler der normalt kun anvendes i rent græs kan også anvendes i græs med kløver, hvis det vælges at prioritere at få ryddet op i ukrudtet og du accepterer at kløveren sprøjtes bort.

Brandbæger

Vårbrandbæger og engbrandbæger er giftige og derfor uønskede – især hvor græsafrøder skal opfodres som ensilage eller hø. Hvor der er vår- eller engbrandbæger på udyrkede naboarealer, kan det være hensigtsmæssigt at begrænse spredning af frø fra disse planter ved at slå arealerne. Landbrugsarealer, der ikke dyrkes, må slås i perioden 1. maj til 30. juni, såfremt flyvehavre, hejrearter, tidsler eller giftige ukrudsarter som vårbrandbæger forekommer. Slåningen skal ske før frøsætning, dvs. i april-maj, hvor der er vårbrandbæger og i begyndelsen af juli, hvor der er engbrandbæger.

Omlægning i sommerperioden

Hvor det er planlagt at omlægge et areal til nyt græs i juli og begyndelsen af august, bør skræpper og andet tokimbladet rod ukrudt bekæmpes effektivt i foråret **uden** at tage hensyn til eventuel kløverbestand. Græsafrøden kan sidst i juli nedvisnes med et glyphosat-middel, hvorefter etablering af såbed og såning af græsfrø kan ske fra sidst i juli til første tredjedel af august. Der er kløvergræsblandinger, som er målrettet våde

arealer. Blanding nr. 26 er en blanding til lavbundsarealer og blanding nr. 36, der indeholder strandsvingel, har stor holdbarhed under fugtige og tørre forhold.

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Følgende punkter indgår i plejen frem mod en veltrimmet varig græsmark:

1. Afpuds eller tag første slæt, før ukrudtet blomstrer. Afpudsning gentages efter behov. F.eks. forsvinder lysesiv og flere andre ukrudtsarter ved gentagne afhugninger tæt på jordoverfladen. Ved gentagende afpudsninger bør man anvende modsat kørselsretning ved den næste afpudsning for at komme så tæt på bunden af siv som muligt. Skræpper kan ikke bekæmpes mekanisk.
2. En kombination af slæt og afgræsning er den bedste græsmarksdrift. Det giver et større udbytte og har bedre effekt mod ukrudt end afgræsning alene.
3. En meget intensiv afgræsning (mange dyr i en kort eller længere periode) eller en afpudsning med kort stubhøjde har en god effekt mod ukrudt.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.