

Hjem > Landdistriktsmidler > 2014 > Formidling og demonstration ny viden > **Ukrudtsbekæmpelse i hestebønner**

Ukrudtsbekæmpelse i hestebønner

Muligheder for kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse i hestebønner.

Hestebønne er en meget åben afgrøde i perioden efter fremspiring og i perioden efter afvisning og frem til modning. I den mellemliggende tid dækker hestebønner ved en passende plantebestand jorden godt med en stor kraftig bladmasse og forholdsvis høje planter.

Kemisk bekæmpelse

Ved forventning om stor fremspiring af ukrudt kan en strategi med to sprøjtninger være nødvendig. I givet fald anvendes et jordmiddel, evt. i blanding med glyphosat, før fremspiring efterfulgt af Fighter 480 + Stomp/Activus i en behovstilpasset dosis efter fremspiring.

Command CS kan anvendes i en dosering på 0,20-0,25 l pr. ha. senest 3 dage efter såning, og har god effekt mod burrester, fuglegræs, tvetand, ærenpris og hyrdetaske.

Fenix kan ligeledes anvendes før fremspiring på fugtig jord, med 0,8-1,0 l pr. ha mod fuglegræs, hyrdetaske, hvidmelet gåsefod, agersennep, tvetand, natlimurt, kamille og enårig rapgræs.

Før fremspiring kan tidligt fremspiret ukrudt nedvisnes med glyphosat. Når hestebønne er sået ensartet i 6-8 cm dybde vil meget ukrudt være spiret frem før hestebønnerne, så der kan opnås en god bekæmpelse. Glyphosat kan blandes med jordmidlerne.

Stomp og **Activus 40 WG** kan anvendes i hestebønne. Midlerne har fortrinsvis jordvirkning, hvilket betyder, at der kan være en mangelfuld bekæmpelse af allerede fremspiret ukrudt. Der kan anvendes 1,2 l eller kg pr. ha. når ukrudt har 0-1 blad. Alternativt kan der ved 1. sprøjtning anvendes 0,6 l/ha Stomp / 0,6 kg/ha Activus 40 WG og ved 2. sprøjtning 5-7 dage senere anvendes 0,6 l/ha Stomp / 0,6 kg/ha Activus 40 WG.

Der er givet en ny godkendelse til mindre anvendelse af **Fighter 480** efter fremspiring, så Fighter 480 nu må anvendes i både hestebønner til foder og udsæd. Fighter 480 kan anvendes i kombination med Stomp eller Activus 40 WG, men kun ved en behandling, idet Fighter i hestebønne kun må anvendes en gang pr. sæson.



Alle midler der kan anvendes til ukrudtsbekæmpelse i hestebønner, er baseret på mindre anvendelse/off-label godkendelser, vejledningerne kan hentes i [Middeldatabasen](#).

[Bekæmpelsesforslag i hestebønner](#)

Mekanisk bekæmpelse

Under fremspiringen er spirerne sårbare og knækker let ved ukrudtsharvning. Når hestebønnerne er kommet op og er blevet bløde, kan de derimod tåle en kraftig ukrudtsharvning. Vær dog opmærksom på, at planterne ikke må knække. Ukrudtsharvningerne kan fortsætte, indtil afgrøden er 10-12 cm høj.

Det er også muligt at etablere hestebønne på dobbelt rækkeafstand, så der kan radrenses uden tab af udbytte.



Billederne er fra forsøg med stigende udsædsmængde, hvor der har været fra venstre mod højre har været tilstræbt 20, 40 og 60 planter pr. m². En god etablering og passende plantebestand er et vigtigt led i at opnå en tilfredsstillende ukrudtsbekæmpelse.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'