



[Hjem](#) > [Landdistriktsmidler](#) > [2014](#) > [Formidling og demonstration ny viden](#) > [Vækstregulering af vinterraps om foråret](#)

Vækstregulering af vinterraps om foråret

I Danmark vurderes der kun at være behov for vækstregulering i marker, hvor der erfaringsvis er meget kraftig vækst.

Caryx er det første middel, som er blevet godkendt til vækstregulering af vinterraps om foråret. Indholdet i den godkendte dosering på 0,7 l Caryx svarer til 0,25 l Juventus + mepiquatchlorid, som også indgår i vækstreguleringsmidlet Terpal.

Midlet skal anvendes ved begyndende strækningsvækst, som i år er i marts. Fra et grovvarefirma er oplyst en listepriis på midlet på 365 kr./l.

Forårsbehandling med Caryx reducerer længdevæksten, så risikoen for lejesæd reduceres. I Danmark vurderes der kun at være behov for vækstregulering i marker, hvor der erfaringsvis er meget kraftig vækst. Det har også været diskuteret, om vækstregulering i meget kraftige marker kan øge høsthastigheden, men der er ikke udført forsøg, der belyser dette.

Firmaet angiver også, at vækstregulering om foråret hæmmer hovedskuddet og stimulerer dannelsen af sideskud, så man får et tykkere skulpelag. Et evt. merudbytte herved vil afspejle sig i merudbytterne i forsøgene. Caryx har indgået med forårsbehandling i 12 landsforsøg i 2012-2013 og her blev kun opnået sikre nettomerudbytter i 2 forsøg (ca. 3 hkg/ha ved en rapspris på 270 kr./hkg). I [planteavlsoverblik 157](#) er vist tyske og danske forsøg med vækstregulering af vinterraps.

Det fremgår af ovenstående, at forsøgsgrundlaget med Caryx er begrænset. Da prisen er relativ høj, kan man derfor evt. gøre sig nogle erfaringer ved at behandle nogle trækk i marken. Der anbefales en dosering på 0,5-0,7 l/ha.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'