

Angreb af stankelbenlarver i græs

■ De seneste dage er meldt om angreb af stankelbenlarver i flere græsmarker. Majs og ærter er de mest robuste afgrøder mod stankelbenangreb. Der er ingen muligheder for bekæmpelse.

Der er ikke længere kemiske løsninger til rådighed til bekæmpelse af stankelben. Miljøstyrelsen gav i efteråret godt nok dispensation til brug af Danadim Progress i græs, men grundet den nye afgift blev prisen for en bekæmpelse for høj nemlig over 2.100 kroner pr. hektar. Der kan desværre ikke anvises andre alternative metoder med væsentlig effekt. Tromling har en vis effekt, men der er meget blandede tilbagemeldinger fra praksis hermed.

Stankelbenene ligger æg i græs i august til primo september. Kort græs foretrækkes.

Normalt findes der flest stankelben i 2. og 3. års græsmarker, der har været afgræsset. Larverne er mest udbredt på humus-, sand- og marskjorder. I PlanteNyt 980 anbefales det at undgå de mest følsomme afgrøder, hvis der er mistanke om angreb af stankelbenlarver i græsset i forfrugten. Alle afgrøder angribes, men erfaringerne er, at ærter og majs er mere robuste end de øvrige afgrøder.

I majs har bejdsemidlet Sonido nogen effekt på både smelder- og stankelbenlarver.

Stankelben forpupper sig normalt omkring Sankt Hans, og aktiviteten aftager omkring Grundlovsdag. Grundet det milde efterår og vinter forpupper larverne sig nok lidt tidligere i år.

Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri



Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne



Naturerhverv.dk



Danmark og Europa investerer i landdistrikterne

Se 'European Agricultural Fund for Rural Development' (EAFRD)