



Hjem > Landdistriktsmidler > 2014 > Formidling og demonstration ny viden > Se efter trips i rug og triticales nu

Se efter trips i rug og triticales nu

Tripsene skader ved at suge indvendigt på bladskederne. Ved kraftige angreb kan bladskederne og fanebladene farves brune. Bekæmp ved mere end 1 trips pr. bladskede.

Ved begyndende skridning af rug og triticales skal marken kontrolleres for angreb af trips. Tripsene skader ved at suge indvendigt på bladskederne. Ved kraftige angreb kan bladskederne og fanebladene farves brune. Vurder angrebsstyrken inde i marken, da angreb oftest er kraftigere i randen af marken. Vær opmærksom på, at de sorte trips sidder under bladskederne. Bladskederne skal derfor åbnes, når marken undersøges for evt. tripsangreb. Senere fremkommer tripsenes larver, der er 1-2 mm og hvide eller rødlige.

Bekæmpelse anbefales ved fund af mere end 1 mørk trips pr. bladskede.

Vinterbyg kan også skades, men oftest optræder der kun få trips i vinterbyg.

For at ramme tripsene inde i bladskederne, skal bekæmpelse udføres lige før begyndende skridning i vækststadium 45, hvor bladskederne åbner sig lidt. Anvend omkring 200 l vand, og sprøjt om morgenen. Tripsene kan også gøre skade senere, men så er det rent sprøjteteknisk ikke muligt at ramme dem.

Følgende pyrethroider kan anvendes til bekæmpelse af trips: 0,15 kg pr. ha Karate 2,5 WG eller 0,15 l pr. ha Cyperb 100/Cyperb 100 W eller 0,04 l pr. ha Cythrin. Ved indkøb af midler med nye afgifter er Karate det billigste middel.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'



Billede 1. Trips i triticales. Foto: Finn Olsen, Sønderjysk Landboforening.



Billede 2. Trips i bladskeden.



Billede 3. Brunfarvede faneblade og bladskejer efter tripsangreb.

Kontakt din **lokale rådgivningsvirksomhed**, hvis du vil vide mere om dette emne.