



Vurdér behovet for at anvende Kerb 400 SC i vinterraps

Kerb 400 SC kan anvendes, når jordtemperaturen kommer under 10 °C.

Anvendelse af Kerb i vinterraps giver et lille bidrag til at forebygge udvikling af herbicidresistens. Kerb er ligesom Stomp-midler en mitose-hæmmer og har dermed en anden virkemekanisme end de øvrige græsukrudtsmidler. Læs mere om [resistensforebyggelse](#).

Hvis der er en stor forekomst af græsukrudt og evt. fuglegræs i vinterrapsen, bør der behandles med 1,0-1,25 l/ha [Kerb 400 SC](#). Anvendelse af 1 l/ha vil normalt være tilstrækkeligt til bekæmpelse af enårig og alm. rapgræs, vindaks, rødsvingel, hundegræs samt timothe. Der bør anvendes 1,25 l/ha, hvor der er meget græsukrudt af agerrævehale, rajgræs, gold og blød hejre, væselhale og flyvehavre.

Kerb 400 SC har en god virkning på fuglegræs og hæmmer ærenpris og burrenerre, men har begrænset virkning på de fleste andre tokimbladede ukrudtsarter (se billede 1).



Billede 1. Kerb 400 SC har god effekt på græs og fuglegræs, men ikke på de fleste tokimbladede arter f.eks. hyrdetaske og tvetand. Marken her er behandlet med Kerb 400 SC.

Veludviklede vinterrapsmarker har normalt en god konkurrenceevne mod ukrudt, mens dårligere udviklede marker, med en mindre konkurrenceevne f.eks. sent såede marker, kan have større behov for ukrudtsbekæmpelse. Undersøg om der eventuelt kun er behov for behandling i dele af marken som f.eks. foragre. I frøgræssædkifter bør Kerb ved forekomst af græsukrudt anvendes til at sanere mod græsserne.

Tidspunkter for anvendelse af Kerb 400 SC

Kerb 400 SC må anvendes på dispensationen, som gælder i maksimalt 120 dage. Der må derfor anvendes Kerb 400 SC fra 01.10.2014 til 31.12.2014 og i hele februar 2015. Det er altså ikke tilladt at anvende Kerb 400 SC i januar. Det er et vilkår i [dispensationen](#) til Kerb 400 SC, at det kun må anvendes på arealer med en stor forekomst af græsukrudt.

- Følg jordtemperaturen i dit [lokalområde](#). Kerb 400 SC anvendes, når jordtemperaturen er under 10 grader C.
- Undgå at anvende Kerb 400 SC i perioder med meget nedbør eller på frossen jord da det kan medføre risiko for efterfølgende overfladeafstrømning fra marken eller via dræn.
- Afsæt et usprøjtet område i marken for at vurdere effekten af en udført sprøjtning senere i sæsonen.

Hvis konkurrence fra græsukrudt eller spildkorn truer væksten af rapsen, inden jordtemperaturen er faldet under 10 °C, bør der anvendes andre midler end Kerb. Mod eksempelvis enårig rapgræs og/eller resistent agerrævehale, hvor der ikke er alternativer, vil der kunne opnås effekt af Kerb, men den kan forventes at være nedsat på grund af for hurtig nedbrydning af midlet.

Udbringning

Det er et vilkår for dispensationen, at sprøjteføreren sidder i en lukket førerkabine med kulfilter, og at der ved udbringning bør anvendes afdriftsreducerende dyser. Undgå risiko for overfladeafstrømning ved at udføre sprøjtningen når der ikke er udsigt til kraftig nedbør. Kerb 400 SC kan udbringes på frossen jord, men det skal ske ved udsigt til at jorden tør op og aldrig ved udsigt til nedbør.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'