



Hjem > Mælkeafgiftsfonden > 2011 > Sundhed - Klovsundhed > **Byld i hvid linje og tå-nekrose – hvad er forskellen?**

## Byld i hvid linje og tå-nekrose – hvad er forskellen?

Beskrivelse af forskellen mellem byld i hvid linje og tå-nekrose.

[Kvægafgiftsfonden](#)

[Mælkeafgiftsfonden](#)

### Byld i hvid linje

En byld i den laterale del af den hvide linje kaldes typisk bare Byld i hvid linje. Den starter med, at såleblødninger gør den hvide linje porøs, der indlejres snavs, der uden oprensning (beskæring) arbejder sig op til læderhuden, hvor blodforsyningen giver snavsset næring, så der dannes en byld. Vrid i klovvævet som følge af skarpe sving eller ujævnt underlag vil bevirke, at indlejret snavs hurtigere arbejder sig op til læderhuden. En byld i den hvide linje breder sig under klovkapslen og kommer eventuelt ud ved kronranden. Ved korrekt og hyppig beskæring vil en byld i den hvide linje være ophelet i løbet af 8 til 12 måneder.

### Tå-nekrose

En tå-nekrose er betegnelsen for en byld i den del af den hvide linje, som ligger i tåen. Den kommer efter en svær mekanisk skade, f.eks. tråd på ujævne spalter eller for hård afrunding af tåen under klovbeskæring. Der behøver ikke at have været såleblødninger forud for denne skade.

Da den hvide linje i tåregionen ligger væsentlig tættere på klovknoglen end resten af den hvide linje, har bylder i tåen en tendens til at inddrage knoglevævet. En tilstand med nekrose af klovknoglens craniale del kaldes en tånekrose. Prognosen er dårlig til slet.

Trods forskellig årsag og prognose kan en tånekrose i det nuværende klovregistreringsprogram ikke registreres separat, men må registreres som en "almindelig" byld i den hvide linje.