

# Mastitis

## Streptococcus dysgalactiae



### Forekomst

*Streptococcus dysgalactiae* er årsag til cirka 10 pct. af yverinfektionerne i Danmark. Dermed er bakterien den tredje vigtigste årsag til akut mastitis (efter *Stafylococcus aureus* og *Streptococcus uberis*).

Bakterien vokser i sår og optræder oftest ved lidt større læsioner end stafylokokker. Ofte findes den sammen med *Arcanobacterium pyogenes* og *Peptococcus indolicus*.

### Symptomer

*Streptococcus dysgalactiae* optræder oftest som akut mastitis med hævede kirtler både i laktationen, ved goldning og i goldperioden.



### Forebyggelse

Undgå sår, tør hud, sprækker, virusinfektioner og pattetråd. Hold god malkehygiejne og brug handsker. Brug pattedesinfektion med blødgøring. Hold god pattehudscondition og smør med pattesalve inden kælvning. Undgå kraftigt yverødem og undgå udtørring med kalk eller lignende. Sørg for korrekt båseindretning og korrekt indstillet malkeanlæg.

### Kort sagt

- God hygiejnisk malkning ved aftørring, forberedelse og påsætning
- Korrekt aftagning og korrekt malkeanlæg
- Malk med handsker, der skiftes og desinficeres jævnligt
- Pattedesinfektion efter malkning med jod mindst 1 pct.
- Goldbehandling med antibiotika
- Tidlig behandling ved akut mastitis.



### Behandling

*Streptococcus dysgalactiae* er meget følsom for penicillin, så hvis der ikke er for store sår, som hyppigt giver gensmitte, er behandlingsresultatet godt efter 3-5 dages behandling.

Læs også SOP for god malkning på:

[www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/SOP](http://www.landbrugsinfo.dk/kvaeg/SOP)