



[Hjem](#) > [Mælkeafgiftsfonden](#) > 2013 > [Foder- og fødevarerikkerhed](#) > **Forurennet raps formentlig årsag til styrtdyk i mælkefedtprocent**

Forurennet raps formentlig årsag til styrtdyk i mælkefedtprocent

En række besætninger har oplevet voldsomt fald i mælkefedtprocenten. Analyser viser, at det formentligt skyldes forurening med planten sæd-dodder, som tilmed kan være skadelig for dyrene.

Mælkeafgiftsfonden

Forurening af rapskager med planten sæd-dodder (*Camelina sativa*) er formentligt årsag til, at en række besætninger i foråret har oplevet mælkenes fedtprocent styrtdykke. Det er konklusionen på en udredning, som VFL, Kvæg besluttede at sætte i gang i ramte besætninger, efter en række henvendelser fra bekymrede konsulenter. Udredningen, som er baseret på analyse af rapskager, viser samstemmende en væsentlig forurening med sæd-dodder på mellem 14 og 20 pct. af fedtmængden. Planten sæd-dodder optræder som ukrudt forskellige steder i Europa og er også aktuell i forbindelse med produktion af bioenergi.

Giftig for koen

Ændret fedtsyresammensætning i foderet bidrager til effekten på mælkenes sammensætning. Men fedtsyrerne er formentligt kun en del af problemstillingen omkring forureningen af rapsen. Glucosinolaterne i sæd-dodder anses for at være giftige for koen på både kortere og længere sigt - og kan i værste tilfælde betyde overførsel af uønskede stoffer til mælken.

Overskrider det maksimalt tilladte indhold

I henhold til regler for markedsføring må fodermidlers botaniske renhed generelt ikke være mindre end 95 pct. Denne grænse er endnu lavere for olieholdige frø eller frugter fra en tidligere fremstillingsproces, hvor den ikke må overstige 0,5 procent for hver type olieholdige frø eller frugter.

Da analyserne peger på et betydeligt indhold i rapskagerne burde de fundne partier ikke være opfodret.

Hvis du får mistanke til kraftfoderet

Hvis du får mistanke til kvaliteten af dit leverede kraftfoder, er det vigtigt, at du har sikret bevis i form af en prøve af kraftfoderet, som firmaet accepterer. Udtagning af prøver bør ske under overværelse af repræsentant for firmaet, landmanden og en uvildig person (f.eks. konsulent). I sammenhæng med formodet indhold af sæd-dodder kan både botanisk analyse og fedtsyresammensætning være relevante som analyser udover standard foderanalyse.

Læs mere [her](#)



Analyse af rapskager fra de ramte besætninger viser forurening med sæd-dodder på mellem 14 og 20 pct. af fedtmængden. Sæd-dodder kan være giftig for koen.