

SALMONELLA: HUSK BLODPRØVNING AF KVIEEJENDOMME

STØTTET AF

mælkeafgiftsfonden

Husk, at man i det højprævalente område har pligt til at få blodprøvet kvier i opdræt på separate ejendomme – uanset besætningens salmonellaniveau.

Husk, at man i det højprævalente område har pligt til at få blodprøvet kvier i opdræt på separate ejendomme – uanset besætningens salmonellaniveau.

Ifølge bekendtgørelsen om salmonella hos kvæg har man pligt til at få blodprøvet kvier i opdræt på separate ejendomme i det højprævalente område. Blodprøverne skal tages på alle kvieejendomme uanset salmonellaniveau. Prøverne skal udtages af kvier, der er indsat inden for de seneste to må-neder. Hvis ejendommen kun modtager dyr fra én besætning (kvieopdræt), skal der udtages otte blodprøver én gang årligt. Kvieejendomme, der modtager dyr fra flere forskellige besætninger (kviehoteller), skal udtage otte blodprøver to gange årligt. Blodprøverne skal tages med et interval på mindst fem måneder og højst otte måneder.



Blodprøvekravet gælder også for kvieejendomme i det lavprævalente område, der modtager dyr fra det højprævalente område.

EJENDOMME I DET LAVPRÆVALENTE OMRÅDE

Blodprøvekravet gælder også for kvieejendomme i det lavprævalente område, der modtager dyr

fra det højprævalente område i henhold til en pasningsaftale. I sidstnævnte tilfælde skal der udtages prøver to gange årligt. Hvis der er indsat mindre end otte dyr inden for de seneste to måneder, kan supplerende prøver udtages af tidligere indsatte dyr.

© 2021 - SEGES Projektsitet