

Faktaark

GRADUERING AF YVERBETÆNDELSE

God yversundhed i besætningen kræver omhyggelig og effektiv håndtering af yverbetændelse. Inddeling af yverbetændelserne efter sværhedsgrad kan være en hjælp til at udvælge de rigtige køer til behandling med antibiotika.

Man kan inddele yverbetændelse i milde, moderate og alvorlige tilfælde:

MILDE TILFÆLDE

Ved milde tilfælde af yverbetændelse er der synlige forandringer i mælken. Men koen har en blød kirtel og er ikke alment påvirket. Det vil sige, at den har normal ædelyst og ikke er syg af yverbetændelsen.

MODERATE TILFÆLDE

Ved moderate tilfælde af yverbetændelse er der synlige forandringer i mælken. Koen har en hævet kirtel, men er ikke alment påvirket. Den har normal ædelyst, men vil nogle gange have lidt nedsat ydelse.

ALVORLIGE TILFÆLDE

Ved alvorlige tilfælde af yverbetændelse er der synlige forandringer i mælken og en hævet kirtel. Koen er alment påvirket med nedsat ædelyst og kraftig nedsat ydelse. Koen er med andre ord syg af yverbetændelsen og kræver ekstra omsorg.

Aftal med dyrlægen, hvordan de forskellige grupperinger håndteres, hvordan der behandles, og hvordan der følges op.

IKKE ALVORLIGE TILFÆLDE

1 = MILD



- 1 FORANDRINGER I MÆLKEN**
Mælken har et vandigt udseende med flager eller klumper.

1 + 2 = MODERAT



- 2 FORANDRINGER I YVERET**
Tegn på inflammation: yveret er hævet, varmt, hårdt, rød eller smerter

ALVORLIGE TILFÆLDE

1 + 2 + 3 = ALVORLIG



- 3 FORANDRINGER HOS KOEN**
Feber, nedsat ydelse, manglende appetit, evt. indsunke øjne, diarré og dehydrering. Koen er med andre ord syg.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne



Se EU-Kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

