

## FORSURING AF GOLDKØERNE KAN FOREBYGGE MÆLKEFEBER – MEN HUSK OPFØLGNING

STØTTET AF

# mælkeafgiftsfonden

Forsuring af goldkøerne de sidste 21 dage før kælvning forebygger effektivt mælkefeber. Men det er vigtigt at følge op på graden af forsuring. Overforsuring kan medføre fald i foderoptagelse.

Forsuring af goldkøer i Close-UP-perioden (de sidste 21 dage inden kælvning) er et effektivt redskab til at forebygge mælkefeber. Men det bør ikke praktiseres, uden at man følger op på graden af forsuring. Hvis man udfodrer rationer, der forsurer for kraftigt, tyder erfaringer og tidligere undersøgelser nemlig på, at goldkøernes foderoptagelse falder.



Det anbefales at formulere Close-UP-rationer til at ligge på -80 til -100 meq./kg TS. CAB-værdien er dog ikke et helt eksakt mål for forsuringen, idet forskellige forsurende salte har forskellig virkningsgrad. Forsuring af goldkøer skal derfor altid følges op med tjek af urin-pH, og ved større foderskift bør der foretages en mineralanalyse af rationen for at sikre, at der ikke forsures for kraftigt.

Læs mere i artiklen [Husk opfølgning på forsuring af goldkøerne](#)