



Støtte af

Kvægafgiftsfonden

Støtte af

Mælkeafgiftsfonden

HVORDAN OPTIMERER MAN SMITTEBESKYTTELSEN? THISE ERFAGRUPPE –DEMONSTARTION SEPTEMBER 2020

Chefkonsulent og Kvægfagdyrlæge Lars Pedersen

Hvad helvede laver du, Egil?
Det er meningen, at vi skal
plyndre og voldtage!



MODSTRIDIGE ØNSKER ELLER UMOTIVERET?



”JA, MEN...”








Colourbox.dk

SMITTEBESKYTTELSE IND I DNA'ET



**VED VI HVAD VI ØNSKER?
ER VI TRO MOD DET VI GØR?
OG MED HVILKEN INDSATS?**






Dyrefaktorer

Smitte



Miljøfaktorer




RISIKOEN for overførsel af smitte afhænger af risikoen ved en enkelt kontakt X antal kontakter



SEGES





SEGES





Colourbox.dk

SÅ HVOR SKAL VI STARTE?





HERRE I EGET HUS



VED DYRGRUPPER DER ER I STØRST RISIKO




HVOR VI HAR KONTAKT TIL MEGET GØDNING





HVOR VI HAR MANGE KONTAKTMULIGHEDER



HVOR RISIKOEN FOR INTRODUKTION ER STOR



Framalkningsspand





SÅ HVAD ER JERES NÆSTE SKRIDT?

Keep it simple
Make it easy
Do your nudging

Smitstof uddør gradvist - decimeringstider

Decimeringstider (D90) i uger for udvalgte bakterier og vira ved lagring i gylletank uden tilførsel af ny gylle

	Sommer, (18-21°C)	Vinter, (6-15°C)
Salmonella	2,0	5,9
E. coli	2,0	8,8
Stafylokokker	0,9	7,1
Streptokokker	5,7	21,4
Parvovirus	> 40	> 40
BVD	0,4	3,0

Decimeringstid på 1 uge – ex. på udvikling i bakterieantal/ml

