

Kvæg

Anbefalinger for at sikre kalvenes suttebehov

SEGES har udarbejdet disse anbefalinger for, hvordan suttebehovet kan opfyldes, og dermed mindske risikoen for unormal sutteadfærd.

Manual



Kalve har et naturligt behov for at sutte i forbindelse med, at de drikker mælk. Opfyldes behovet ikke, er der risiko for, at de begynder at sutte på andre kalve eller inventar. SEGES har disse anbefalinger for, hvordan suttebehovet kan opfyldes, og dermed mindske risikoen for unormal sutteadfærd.

Lovkrav om at opfylde kalves suttebehov

Kalves suttebehov skal dækkes i forbindelse med mælkeoptagelse. Det kan ske ved brug af pattespand, pattebar eller mælkeautomat; ved brug af narresut, der er placeret tæt på mælkeskålen/mælketruget eller ved løst liggende flydende narresut i drikkeskålen/truget.

Ved brug af pattespand eller pattebar skal der være mindst en patte pr. kalv. Ved brug af narresut skal der også være mindst en pr. kalv og de skal være tilgængelige i mindst 20 minutter efter mælketildelingen.

Derudover skal kalve på over to uger altid have adgang til frisk vand, og endelig må kalve ikke sondefodres, medmindre det er påkrævet for at behandle kalven mod sygdom.



Anbefalinger til at opfylde kalves suttebehov

1. Tildel stor mælkemængde – gerne som to-trins mælketildeling, hvor kalve 0-4 uger får 8-10 l og kalve 5-7 uger får 5-6 l pr. dag, med gradvis overgang. Jerseykalve et par liter mindre. Dertil kalvefoder ad lib. Så bliver kalvene mætte og har stor tilvækst allerede fra starten og man undgår et for stort dyk i foderoptagelse ved fravæning. Desuden giver det mere mælk i både første og anden laktation.
2. Tildel mælk via pattespand eller pattebar, og lad spanden/baren hænge i mindst 20 minutter efter der er drukket op. Det nedsætter graden af unormal sutteadfærd. Hos de store mælkefodrede kalve kan det være nødvendigt, at fjerne pattespandene/pattebaren når mælken er drukket for at undgå, at kalvene sutter patterne i stykker. Opsæt i stedet narresutter.
3. Undgå at hurtigt-drikkende kalve fortrænger langsomt-drikkende kalve ved at opsætte adskillelser mellem kalvene. Adskillelserne skal nå mindst ned til kalvenes skuldre.
4. Patter og narresutter skal være hele og af god kvalitet. Fødevarestyrelsen godtager ikke stykker af vandslange eller flossede narresutter.
5. Placer narresutter i nærheden af, hvor kalvene drikker mælken. Det øger chancen for, at kalvene bruger sutterne i stedet for at sutte på hinanden eller inventaret.
6. Placer også sutterne over kalvehøjde. Så er der mindre risiko for, at de bliver forurenede med gødning.
7. Monter sutterne på en flytbar planke eller lignende. Det gør det lettere at tage sutterne ned og få dem grundigt rengjort.
8. Rengør og desinficer sutterne jævnligt. Brug alkalisk sæbe og desinfektionsmiddel efter vejledningerne på dunkene.

Emneord

Dyreetik, dyrevelfærd og dyreadfærd

Foder og fodring

Fodring af småkalve

+2

Publiceret: 28. januar 2021

Opdateret: 28. januar 2021

Vil du vide mere?



Peter Raundal

Specialkonsulent

SEGES

pra@seges.dk

+45 8740 6680

Støttet af

Mælkeafgiftsfonden

Kvægafgiftsfonden



Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. SEGES Tlf. 87 40 50 00
Agro Food Park 15 Fax. 87 40 50 10
8200 Aarhus N Email info@seges.dk

