



MANGE SÅR EFTERAFGRØDE I MAJS FOR SENT

STØTTET AF

mælkeafgiftsfonden

Hvis en hektar efterafgrøde kikker, falder kvælstofkvoten med ca. 0,8 procentenheder. Kom i gang i ordentlig tid og følg disse tips.

Rette tid for at så efterafgrøde i majs er tidligere, end mange tror.

For at efterafgrøde i majs skal lykkes, kan du følge disse råd:

- Så efterafgrøden allerede når majsens har 5-6 blade.
- Radså med trykhjul i 4 såspor med 12 cm afstand eller 3 såspor med 18 cm afstand.
- Brug 6-10 kg pr. ha af alm. rajgræs, gerne halv diploid og halv tetraploid alm. rajgræs. Størst udsædsmængde ved dårlig såteknik, tørre forhold og stor andel tetraploid rajgræs. Tetraploid alm. rajgræs vokser hurtigere til end diploid alm. rajgræs, men har dobbelt så store frø og derfor halv så mange frø pr. kg.
- Brug diploid ital. rajgræs ved sen såning af efterafgrøde, når majsens har 8-10 blade.
- Bruger du en god såteknik, og sår efterafgrøden rettidig, kan du forbedre efterafgrøden betydeligt ved at blande cikorie i – brug fx. en blanding af 6-8 kg alm. tetraploid rajgræs og 0,5-1,0 kg cikorie pr. ha. Cikorie tåler skygge og trives forholdsvis godt i bunden af en tæt



Efterafgrøde af alm. rajgræs sået i 4 såspor med radsåningsudstyr og trykhjul på 12 rækket radrenser. Foto SEGES

majsafgrøde.

Læg 25-30 kg kvælstof pr. ha ud langs rækkerne i forbindelse med radrensning, så kvælstofforsyningen til majsens er tilstrækkelig, selvom efterafgrøden bliver for kraftig. Det er særlig vigtigt, når kvælstofniveauet er lavt, fx. i majs efter flere års majs- eller korndyrkning.

MILJØFOKUS-OMRÅDER (MFO) DUR IKKE I MAJS

Efterafgrøder, der skal opfylde kravet om miljøfokusområder (MFO) bør ikke sås i majs, da det er svært at opnå en tilstrækkeligt dækkende efterafgrøde i majs fra begyndelsen af september. Desuden forsinker MFO-efterafgrøde i majs udbetalingen af støtten. MFO-efterafgrøde kan fx. være kløverudlæg, etableret i vårbyg til enten modenhed, grønkorn eller helsæd. Brak til erstatning af MFO-efterafgrøde er også en mulighed for nogle.

HVIS DU ALLIGEVEL VIL SÅ MFO-AFGRØDE I MAJS

Ønsker man at etablere MFO-efterafgrøde i majs, bør det ske i en mark, som ikke bliver kraftig og tæt.

Der er en rimelig sikkerhed for, at efterafgrøden kan være dækkende fra begyndelsen af september, hvis man gør følgende:

- Vælg en majsmark, hvor der ikke har været kløvergræs inden for de seneste 2-3 år
- Vælg en tidlig majssort
- Så 8-10 kg alm. rajgræs, gerne halv diploid og halv tetraploid, når majsens har 4 blade (ca. 4 uger efter såning). Radrensning erstatter anden sprøjtning, og efterafgrøden sås i forbindelse med radrensning eller umiddelbart efter. Benyt en såteknik, som sikrer hurtig og sikker fremspiring, fx radsåning med trykhjul og dybdestyring. Cirka to uger efter såning af efterafgrøden kan der sprøjtes mod tokimbladet ukrudt.
- I majsmarker efter kløvergræs kan sås 6-8 kg strandsvingel pr. ha senest 2 uger efter majssåning. Dette kræver dog arealer, der kan vandes, kløvergræs som forfrugt og intet behov for at bekæmpe græsukrudt.

Det er altid landmandens ansvar, at efterafgrøden opfylder kravene til MFO-efterafgrøder, uanset vejrforhold og om han har fulgt de anbefalede principper for etablering.

Læs mere i artiklen [Efterafgrøder i majs](#)

Artiklen har været bragt i KvægNyt nr. 8, 2020

