

Se efter trips i rug og triticale

Tripsene skader ved at suge indvendigt på bladskederne. Ved kraftige angreb kan dette resultere i, at bladskederne og fanebladene farves brune. Bekæmp ved fund af mere end 1 trips pr. bladskede.



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Ved begyndende skridning af rug og triticale skal marken kontrolleres for angreb af trips. Vurder angrebsstyrken inde i marken, da angreb oftest er kraftigere i randen af marken. Vær opmærksom på, at de sorte trips sidder **under** bladskederne. Bladskederne skal derfor åbnes, når marken undersøges for evt. tripsangreb. Senere fremkommer tripsenes larver, der er 1-2 mm og hvide eller rødlige.

Bekæmpelse anbefales ved fund af mere end 1 mørk trips pr. bladskede.

Vinterbyg kan også skades, men oftest optræder der kun få trips i vinterbyg.

For at ramme tripsene inde i bladskederne, skal bekæmpelse udføres lige før begyndende skridning i vækststadium 45, hvor bladskederne åbner sig lidt. Anvend omkring 200 l vand, og sprøjt om morgenen. Tripsene kan også gøre skade senere, men så er det rent sprøjteteknisk ikke muligt at ramme dem.

Følgende pyrethroider kan anvendes til bekæmpelse af trips: 0,15 kg pr. hektar Karate 2,5 WG eller 0,15 l pr. hektar Cyperb 100.



Billede 1. Trips i triticale.

Foto: Finn Olsen, Sønderjysk Landboforening.



Billede 2. Trips i bladskeden.



Billede 3. Brunfarvede faneblade og bladskeder efter tripsangreb.

By Rich Haddock