



Ukrudt i hestebønne

Ukrudt bekæmpes kemisk før fremspiring og evt. mekanisk efter fremspiring.

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Hestebønne er en meget åben afgrøde i perioden efter fremspiring og i perioden efter afvisning og frem til modning. I den mellemliggende tid dækker hestebønner jorden godt med en stor kraftig bladmasse og forholdsvis høje planter.

Kemisk bekæmpelse

[Command CS](#) kan anvendes senest 3 dage efter såning og har god effekt mod burrester, fuglegræs, tvevand, ærenpris og hyrdetaske. [Off-label-vejledningen](#) kan du hente i [Middeldatabasen](#). Doseringen er 0,20-0,25 l pr. ha og der skal udsprøjtes senest 3 dage efter såning.

Før fremspiring kan tidligt fremspiret ukrudt nedvisnes med glyphosat. Når hestebønne er sået ensartet i 6-8 cm dybde vil meget ukrudt være spiret frem før høstebønnerne, så der kan opnås en god bekæmpelse.

Der er ingen godkendte midler til anvendelse efter fremspiring af hestebønne til foder.

I hestebønne til fremavl er der opnået off-label-godkendelse af [Fenix](#) før fremspiring og [Fighter 480](#) efter fremspiring. Vejledningen kan hentes i Middeldatabasen.

Mekanisk bekæmpelse

Under fremspiringen er spirerne sårbare og knækker let ved ukrudtsharvning. Når hestebønnerne er kommet op og er blevet bløde, kan de derimod tåle en kraftig ukrudtsharvning. Vær opmærksom dog på, at planterne ikke må knække. Ukrudtsharvningerne kan fortsætte, indtil afgrøden er 10-12 cm høj.

Det er også muligt at etablere hestebønne på dobbelt rækkeafstand, så der kan radrenses, uden tab af udbytte.

By Rich Haddock