

Nyt om skadegørere i vintersæd, vårsæd og rajgræs i registreringsnettet - uge 25

Registreringer fra den 18. og 19. juni viser, at der er mest *Septoria* i Hereford.

Vinterhvede. Angrebene af *Septoria* er øget i den forløbne uge og ligger på niveau med angrebene de to foregående år. Se figur 2 nedenfor. Der vil løbende ca. 3 uger efter nedbør vise sig nye symptomer. Mest *Septoria* er fundet i Hereford. Der er i ubehandlede marker fundet gulrust i 15 procent af markerne. Se også figur 3 nedenfor. Der er også fundet gulrust i flere vårhvedesorter.

Vinterrug. Brunrust har igen bredt sig i den forløbne uge. Selv om det relativt sent kan være aktuelt at bekæmpe brunrust, skønnes bekæmpelse nu ikke længere aktuel. Der skal nu ikke foretages flere registreringer i rug i år.

Vårbyg. Angrebene af både skoldplet, bygbladplet og bygrust er overvejende svage, men i enkeltmarker er fundet betydelige angreb af en eller flere af sygdommene. I Propino er udløst meldugbekæmpelse i ca. 10 procent af markerne. Der er fortsat mange bladlus.


Havre. Meldugangrebene har bredt sig i den forløbne uge, og der er udløst bekæmpelse i nogle marker. Mest meldug er fundet i Scorpion og mindst i Canyon. Der er fundet havrebladplet i enkelte marker. Angreb kan forveksles med *Septoria*, havrepletbakteriose og vindslid. Der er fortsat mange bladlus.

Alm. rajgræs. Kronrust er fortsat meget udbredt, mens der ikke er fundet sortrust.

Hvedegalmug. Der er relativ få hvedegalmug, og de længst udviklede marker er ikke længere modtagelige. Vær også fra begyndende skridning opmærksom på evt. angreb i vårhvede.

Se de uddybende kommentarer til de enkelte afgrøder nedenfor.

- [Vinterhvede](#)
- [Vinterrug](#)
- [Alm. rajgræs](#)
- [Vårbyg](#)
- [Havre](#)
- [Hvedegalmug](#)
- [Maishalvmøl](#)




Figur 1. Fire strategier for svampbekæmpelse i vinterhvede. De angivne doser er ekskl. meldugmiddel, der tilsættes ved behov for meldugbekæmpelse.


Promilleafgiftsfonden for landbrug



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.



Figur 2. Udviklingen af Septoria i hvede i 2012 i forhold til samme tidspunkt i de to foregående år.



Figur 3. Udviklingen af gulrust i hvede i 2012 i forhold til samme tidspunkt i de to foregående år.

By Rich Haddock