

Bladlus på vej


Planteavlskonsulenternes registreringsnet viser, at der stadig kun er intet eller meget lidt bygrust i vinter- og vårbyg. Men der meldes om meldug i flere Propino-bygmarker og begyndende angreb af bladlus i vårbyg og havre.

Af Merete Hattesen

»Septoria har ikke udviklet sig ret meget i vinterhvede de sidste uger. Det er tørt mange steder, og mange har sprøjtet mod Septoria den 20-25. maj, så sidste sprøjtning er den 10-15. juni. Husk også effekt mod gulrust, da der er fundet gulrust i seks pct. af de ubehandlede marker fordelt i en del sorter,« fortæller landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen fra Videncentret for Planteavl.

I vinterbyg er bekæmpelse stort set overstået. I triticale har gulrustangrebene ikke bredt sig i den forløbne uge. Men i ubehandlet Rag-tac og Tulus ses meget meldug. I vinterrug skal der nu kun holdes øje med evt. angreb af brunrust, hvor selv sene angreb kan være tabsvoldende, råder Ghita Cordsen Nielsen.

»I vårbyg er der i Propino udløst meldugbekæmpelse i 10 pct. af markerne. Skold-



Udviklingen af Septoria i hvede i 2012 i forhold til samme tidspunkt i de to foregående år. Kilde: Videncentret, Planteavl.

plet er ellers den mest udbredte svampesygdom. I nogle marker med forfrugt vårbyg og reduceret jordbearbejdning er der meldt om meget skoldplet. Et enkelt sted også udbredt angreb af hvedebrunplet i vårbyg, hvilket er usædvanligt.»

Der er kun svage meldugangreb i havre enkelte steder. I alm. rajgræs er der kronrust i 45 pct. af de ubehandlede marker. Det kølige og blæsende vejr er ugunstig for hvedegalmyggene. Men i vårbyg er der fundet bladlus i 30 pct. af markerne med op til 25 pct. angrebne strå.

Og i havre i 25 pct. af markerne med op til 30 pct. angrebne strå. I vinterhvede er der bladlus i de første marker med op til fem pct. angrebne strå.

”I vårbyg er der fundet bladlus i 30 pct. af markerne med op til 25 pct. angrebne strå. Og i havre i 25 pct. af markerne.

Ghita Cordsen Nielsen