




Hjem > Promilleafgiftsfonden > 2012 > Planteværnsmidler > Kålfluer - varslings for æglægning

Kålfluer - varslings for æglægning


Aktuel varslings for kålfluens æglægning i kålafgrøder baseret på temperaturen i 2012.

Man kan se varslings for ens eget område ved at vælge postnr. under figuren.

Eksempel på varslings d. 18. april 2012:



Eksempel på varslings d. 8. maj 2012:




Eksempel på varslings d. 12. juni 2012:


Promilleafgiftsfonden for landbrug




Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.



Eksempel på varsling d. 23. juli 2012:



Eksempel på varsling d. 13. august 2012:



Forklaring til modellen og figuren

Den lille kålflues larver overvintrer i jorden i marker efter raps og kål. Når den nødvendige udviklingstemperatur er nået - typisk medio maj - klækkes 1. generation kålfluer, der straks søger mod korsblomstrede afgrøder for at lægge æg. Æggene lægges oftest i den øverste ½ cm af jorden tæt på plantens stængel, når dagtemperaturen når over 12-14 °C. Kålfluens larver kan gøre stor skade i nyplantede kål. Kålfluen har to generationer. Den 2. generation lægger normalt æg i juli måned.

Modellen forudsiger tidspunktet for æglægning baseret på en graddags-model med basistemperatur 6 °C. I de grønne perioder er der ingen æglægning. Gult angiver, at udviklingen skal følges nøje - især på lune solrige lokaliteter. Rødt angiver perioder, hvor kålfluen lægger æg. Modellen siger noget om æglægningstidspunktet, men ikke noget om forventet angrebsstyrke.

Figuren viser risikoen for æglægning for begge generationer. Til sammenligning vises graddage-udviklingen for de seneste to år på samme lokalitet (postnr.). Bemærk, at der enkelte steder nord for Limfjorden også kan være forekomst af den store kålflue. På disse lokaliteter skal man følge udviklingen i marken ekstra omhyggeligt.