

Hjem > Promilleafgiftsfonden > 2012 > Planteværnsmidler > **Nyt om skadegørere i vintersæd, vårsæd og rajgræs i registreringsnettet - uge 21**

Nyt om skadegørere i vintersæd, vårsæd og rajgræs i registreringsnettet - uge 21

Registreringer fra den 21. og 22. maj viser, at skoldplet har bredt sig meget i vinterbyg og rug. Der er sket smitte med *Septoria* i hvede. I vinter- og vårbyg findes ingen eller kun meget lidt bygrust.

I **vinterhvede** har nedbøren udløst Septoriabekæmpelse i mange marker. I figur 1 nedenfor ses, at strategi 2 eller 3 (og 1) er aktuel afhængig af vækststadiet, hvor bekæmpelse er udløst.

I pløjede marker ses pt. kun lidt hvedebladplet, mens der er relativ kraftige angreb i flere marker med reduceret jordbearbejdning og forfrugt hvede.

Der er udløst meldugbekæmpelse i godt 10 procent af markerne. Tilfælde af meget meldug er fundet i flere sorter og mest i Mariboss, Jensen, Hereford og Frument. Flere melder, at angrebet især i Jensen har bredt sig i den forløbne uge.

Der er fundet enkelte tilfælde af gulrust i Tuareg og JB Asano og meget i sorten Oakley, som ikke er særlig udbredt i dyrkningen.

I **vinterbyg** har skoldplet igen bredt sig, og der er bekæmpelsesbehov i en del marker. Der er mindst skoldplet i Matros. I figur 1 nedenfor er udviklingen af skoldplet i år sammenlignet med udviklingen på samme tidspunkt i de to foregående år.

Der er fortsat relativ svage angreb af bygrust og bygbladplet. I nogle marker med bl.a. Matros ses plettypen af bygbladplet. Se foto 1 nedenfor.

I **triticale** er der fortsat meget gulrust og i nogle marker også meldug.

I **vinterrug** er der udløst bekæmpelse af skoldplet i en del marker.

I **vårbyg** er der ikke fundet angreb af bygrust og ingen eller svage angreb af øvrige svampesygdomme bortset fra et enkelt tilfælde af mere udbredte angreb af skoldplet.

I **havre** er der ikke fundet meldug.


I **alm. rajgræs** er der kronrust i ca. 40 procent af markerne.

Hvedegalmug. De første aflæsninger af feromonfælderne er foretaget. Husk at få fælderne sat op i markerne, hvis det ikke allerede er sket. Hveden er modtagelig for angreb fra begyndende skridning.

Nedenfor ses link til registreringerne og mere uddybende kommentarer til de enkelte afgrøder.

Vær opmærksom på, at der i den kommende uge registreres tirsdag og onsdag grundet pinse.

- [Vinterhvede](#)
- [Vinterbyg](#)
- [Triticale](#)
- [Vinterrug](#)
- [Alm. rajgræs](#)
- [Vårbyg](#)
- [Havre](#)
- [Hvedegalmug](#)




Figur 1. Fire strategier for svampbekæmpelse i vinterhvede. De angivne doser er ekskl. meldugmiddel, der tilsættes ved behov for meldugbekæmpelse.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.



Figur 2. Udviklingen af skoldplet i vinterbyg i år i forhold til samme tidspunkt i de to foregående år.



Billede 1: Der er ikke meget bygbladplet pt. I bl.a. vinterbygssorten Matros ses dog enkelte pletter af bygbladplet. Normalt er nettypen af bygbladplet mest udbredt, men pt. ses mest af plettypen.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.