

Effekt af ukrudtsmidler i majs

Tabel med effekt af aktuelle ukrudtsmidler i majs.

Tabellen angiver forventet effekt mod ukrudt med op til to løvblade i majs ved de angivne doseringer. På grund af den lange periode, hvor majsene ikke dækker jorden, er der normalt behov for yderligere en til to behandlinger mod nyfremspiret ukrudt. For rodukrudt vil det oftest være nødvendigt med opfølgende behandling på genvækst for at opnå de angivne effekter.

Effekterne er angivet efter en vurdering af data fra firmaernes effektivitetsvurderinger, landsforsøg, effektangivelser i Planteværn Online samt indsamlede erfaringer fra praksis. I de fleste forsøg er ukrudtsbekæmpelsen gennemført i et bekæmpelsesprogram eller med høj dosis, hvorfor det er med visse forbehold de enkelte effekter er angivet. Rangordningen af midlernes effekt mod enkelte arter giver imidlertid viden om, hvilke midler der bør være 'bærende' mod forskellige ukrudtsbestande.

Tabel 1. Opdateret den 29. maj bl.a. med effektdata fra svenske forsøg. Effekt af ukrudtsmidler i majs mod frøkrudt med op til to løvblade og rodukrudt, der har nået det følsomme stadium.

Læs også: [Ukrudt i majs](#)

Vi modtager gerne dine erfaringer om effekt af midlerne mod ukrudt i majs.

By Rich Haddock

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.