

**Tilfælde af meget hvedebladplet i upløjede marker med forfrugt hvede**

De seneste dage er modtaget flere henvendelser om tilfælde af relativ kraftige angreb af hvedebladplet i upløjede hvedemarker med forfrugt hvede.

De seneste dage er modtaget flere henvendelser om tilfælde af relativ kraftige angreb af hvedebladplet (DTR) i upløjede hvedemarker med forfrugt hvede. Svampen overlever på planterester af hvede.

Strategi for svampebekæmpelse i hvede med reduceret jordbearbejdning og forfrugt hvede er nærmere omtalt i [plantenyt nr. 559, 2012](#). Fra og med vækststadiet 32 (2 knæ udviklet) anbefales løsninger, der har god effekt på både hvedebladplet og Septoria, dvs. Proline eller Zenit/Bumper/Tilt 250 EC iblandet Septoriamidler f.eks. Rubric eller Bell.

Det er vigtigt, at fanebladet senere bliver beskyttet, straks det kommer frem, da tiden fra smitte med hvedebladplet til symptomer ses, kun er 3-7 dage.

Bemærk at både Zenit, Bumper/Tilt 250 EC og Proline maksimalt må anvendes 2 gange pr. vækstsæson.

Der er pt. ikke meldt om angreb i pløjede marker.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.



Billede 1. Angreb af hvedebladplet. Meget tidlige angreb.



Billede 2. Senere angreb af hvedebladplet.



Billede 3. Smitte af hvedebladplet sker fra planterester af hvede.

By Rich Haddock