



Jordtest for sædskiftesygdommen ærterodråd

Hvis der i 2013 skal dyrkes ærter på et areal, hvor der tidligere har været ærter, er det en god ide at få udført en jordtest i efteråret 2012 for smitte af ærterodråd. Smitstoffet kan holde sig smittedygtig i jorden i 15-20 år.

Hvis der skal dyrkes ærter i 2013, er der ved tidligere ærterdyrkning på arealet en god ide at få udført en jordtest i efteråret 2012 for smittegrad af sædskiftesygdommen ærterodråd (*Aphanomyces euteiches*). Der er for mange år siden udviklet en jordtest, der kan fastslå smitstofmængden af ærterodråd i jorden. Ærterodråd er den mest tabsgivende svampesygdom i ærter, og smitstof kan holde sig smittedygtig i jorden i 15-20 år. Testen siger noget om risikoen for tabsvoldende angreb. I sidste ende er angrebet også afhængig af de klimatiske forhold i vækstsæsonen. Ved vurdering af testresultatet antages det dog, at der i den kommende sæson bliver gode betingelser for sædskiftesygdommen. Resultatet af jordtesten skal derfor betragtes som et vejledende udtryk for det værste tænkelige sygdomsangreb, der kan forekomme i marken. Forekommer der andre rodsygdomme, vil de også blive angivet.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Testen tager 5 uger

Jordtesten udføres af Findus i Sverige, og testen tager 5 uger. Jordprøven kan derfor udtages i efteråret eller i foråret, men hvis man udtager jordprøven i efteråret, er man sikker på rettidigt svar. Jordprøven må ikke være meget tør, når prøven udtages, da det kan give falske negative resultater. Prøven sendes til:

Findus R&D
Att.: Anna-Kerstin Arvidsson
Sellebergavägen 13
267 40 Bjuv
Sverige

Der indsendes i alt 3 l jord pr. prøve. Afsenderadresse skal angives af hensyn til svar og faktura. Jorden udtages med jordbor i pløjedybden over et større område og blandes sammen (mindst 10 delprøver). Hvor mange prøver der bør udtages, findes der ingen retningslinier for, men jo flere prøver jo mere sikker bliver resultatet selvfølgelig. Måske bør der udtages en prøve pr. ca. 5 ha. Hver analyse koster 1200 svenske kr. + moms.



Billede 1. Ærter angrebet af ærterodråd.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.