

Lys bladplet i vinterraps

Der er modtaget meldinger om angreb af lys bladplet i nogle vinterrapsmarker.

I nogle vinterrapsmarker findes ret udbredte angreb af lys bladplet. Se billede 1- 5. Undersøg derfor markerne for evt. angreb.

Der er forskelle i sorternes modtagelighed, men der foreligger kun oplysninger fra udlandet og kun for nogle sorter. Se data for nogle sorters modtagelighed i [Plantenyt nr. 371, 2011](#).

Lys bladplet spredes med vinden og regnplask. Svampen trives bedst ved fugtighed. Ved 5-15 °C og min. 13 timers bladfugt kan infektionen ske indenfor 5 dage.

Nogen bekæmpelsestærskel er ikke kendt. Breder angrebet sig dog opad planterne og til knopperne, så anbefales bekæmpelse med 0,5 l Folicur eller 0,6 l Orius pr. ha, der kun må anvendes, såfremt der også forekommer angreb af rodhalsrød eller gråskimmel. Vær opmærksom på, at Folicur/Orius kun må anvendes 2 gange pr. vækstsæson.

Ved svagere angreb kan bekæmpelse trækkes til under blomstring, hvor der ved bekæmpelse af knoldbægersvamp/skulpesvamp anvendes midler, der også har effekt mod lys bladplet. Se tabel 1.

Meldinger om angreb og evt. sortsforskelle modtages gerne via planteavlskonsulenten.

Tabel 1. Effekten af godkendte svampemidler i raps (Oversigt over Landsforsøgene 2011 s. 176).

Sygdomme	Amistar/ Mirador (azoxy- strobin)	Cantus (bos- calid)	Folicur/ Orius (tebuco- nazol)	Juventus (metco- nazol)	Prosaro (tebu- conazol + prothio- conazol)
Knoldbægersvamp	***	***(*)	***	***	***(*)
Gråskimmel	**(*)	***	**	**	*(*)
Skulpesvamp	***	***	**	**	**
Rodhalsrød	(*)	***	**(*)	**(*)	***
Lys bladplet	-	*	***	**(*)	***
Kålskimmel	(*)	-	-	-	-
Normaldosering, l/kg pr. ha	1,0	0,5	1,0/1,25	1,0	1,0
Pris pr. normaldosering inkl. afgift, ekskl. moms	400	385	202/213	310	390

* = svag effekt,
 ** = nogen effekt,
 *** = middel til god effekt,
 **** = meget god effekt,
 (*) = en halv stjerne,
 - = ingen effekt.



Billede 1. Begyndende angreb af lys bladplet. I fugtigt vejr ses små hvide "totter".

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.



Billede 2. Friske angreb af lys bladplet fotograferet i sorten Troubadour den 13. april. Kun de nederste blade var angrebet i denne mark. Symptomerne kan til tider ligne en svidning (foto: Finn Olsen, Sønderjysk Landboforening).



Billede 3. Angreb af lys bladplet. Det øverste af bladhuden sprækker og ser meget tør og læderagtigt ud.



Billede 4. Angreb af lys bladplet kan resultere i skævvredne blade.



Billede 5. Angreb af lys bladplet på skulper, skulpestilke og knopper.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.