

Tjek alle majsmarker for øjeplet

Den senere tid er fra flere landsdele modtaget en del meldinger om angreb af majsøjeplet, og i flere marker er svampebekæmpelse aktuel.

De seneste dage er fra flere landsdele modtaget en del meldinger om angreb af majsøjeplet i majs. Mest angreb ses i marker med forfrugt majs og reduceret jordbearbejdning, men også i pløjede marker er i mange tilfælde set angreb, især i foragrene.

Det er meget tidligt at se angreb, og den senere tids nedbør vurderes at have fremmet svampen.

Svampebekæmpelse har bedst effekt ved svage angreb. Bekæmpelse anbefales ved over 5-10 procent angrebne planter. Bekæmpelse er aktuel i en del marker.

Afhængig af tidspunktet, hvor bekæmpelsestærsklen overskrides, anbefales en af følgende strategier:

- enten gives 0,5 l Opera, fra at majs er omkring 1 meter høj, og behandlingen gentages efter ca. 2-3 uger, hvis angrebene stadig er aktive.
- eller der kan satses på én behandling med 0,75 l Opera, når sidste blad er udviklet, og det stadig er muligt at køre med sprøjten.

Anvend med en konventionel sprøjte 150-200 l vand. Jo højere majs jo mere vand.

Se yderligere i plantenyt nr. [661](#) og [644](#).



Billede 1. Begyndende angreb af øjeplet fotograferet i indeværende uge i opløjet mark med forfrugt majs.



Billede 2. Samme som billede 1 men her er samme symptom fotograferet op imod lyset.

By Rich Haddock

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.