



Gylleudbringning til græs og raps frem til oktober

Planlæg efterårsudbringning af gylle, så du er sikker på at have tilstrækkelig opbevaringskapacitet frem til foråret. Husk de nye krav til udbringningsmetode, som er omfattet af krydsoverensstemmelse.

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Gylle til fodergræs

Det er en rigtig god græssæson i år, mange græsmarker står fantastisk godt. Vandforsyningen er i orden, og væksten er kun begrænset af mangel på kvælstof fra gødning og/eller manglende kløver. Græsmarkerne har derfor god udnyttelse af kvælstof og kalium fra gylle udbragt i august måned, hvor temperaturen er høj, og der stadig er god tid med vækst.



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Græsset kan godt udnytte 25-30 tons gylle pr ha, så sørg for at få tømt ud i gyllebeholderen, så opbevaringskapaciteten er sikret frem til foråret. Læs evt. [PlanteNyt om opbevaringskapacitet på kvægbrug](#).

Udnyttelsen af gyllen falder og bliver mere usikker ved udbringning i september måned. Senere udbringning end august bør derfor kun anvendes som nødløsning i forhold til opbevaringskapaciteten. Hellere udbringe en større mængde i august end at satse på udbringning i september.

Gylle til vinterraps

Gylle til vinterraps kan nedfældes før såning eller slangeudlægges efter fremspiring. Det er vigtigt, at planlægge udbringningen, så opbevaringskapaciteten frem til foråret sikres. Læs evt. [PlanteNyt om opbevaringskapacitet på svinebrug](#).

Ved nedfældning af gylle før såning, nedfældes gyllen i stubben, som herefter pløjes. Herved begrænses skaderne fra nedfælderens, som rapsen er følsom overfor. På den tunge, lerede og våde jord kan det være en fordel, at vente til efter fremspiring og slangeudlægge gyllen, når rapsen er i god vækst. Er der behov for udbringning af store mængder gylle (>30 t/ha) til sikring af opbevaringskapaciteten, nedfældes gyllen, og rapsen sås så tidligt som muligt for at udnytte en lang vækstperiode inden vinteren. Skal en stor gyllemængde slangeudlægges, anbefales det at gøre det, så snart rapsen er i god vækst, f.eks. ved 3-4-bladstadiet.

Stor gyllemængde og gode temperaturer kan give en kraftig vækst, som kan udløse behov for vækstregulering af rapsen inden vinteren.

Anbefalede næringsstoffer og -mængder fremgår af [PlanteNyt om Gødskning af vinterraps](#).

Husk reglerne for udbringningsteknik

Husk kravene om nedfældning i fodergræs og på "sort jord" – dvs. **også** inden såning af raps. I fodergræs kan nedfældningskravet erstattes af slangeudlægning af forsuret gylle, men det kan det **ikke** til vinterraps! Gyllen må her kun slangeudlægges **efter** såning.

Reglerne for udbringningsteknik er indskrevet i [Veiledning om krydsoverensstemmelse](#), og betyder således, at der er risiko for træk i Enkeltbetalingsstøtten (krav 1.14, delkrav 1), i tilfælde af overtrædelser.

By Rich Haddock