

Hvedebladplet i opløjede marker med forfrugt hvede

■ De seneste dage er modtaget flere henvendelser om tilfælde af relativt kraftige angreb af hvedebladplet (DTR) i opløjede hvedemarker med forfrugt hvede, oplyses det i PlanteNyt 595.

I en strategi for svampebekæmpelse i hvede med reduceret jordbearbejdning og forfrugt hvede anbefales løsninger, der har god effekt på både hvedebladplet og Septoria fra og med vækststadium 32 (2 knæ udviklet).

Det er vigtigt, at fanebladet senere bliver beskyttet, straks det kommer frem, da tiden fra smitte med hvedebladplet til symptomer ses, kun er 3-7 dage.

Der er pt. ikke meldt om angreb i pløjede marker.

kl

Angreb af stankelben i marker efter græs

■ I den senere tid er der modtaget flere henvendelser om angreb af stankelben i marker med forfrugt græs. Angreb ses især på lette jorder og humusjorder. Stankelben forpupper sig omkring Sankt Hans, men aktiviteten aftager omkring Grundlovsdag. Eventuel omsåning tilrådes derfor først omkring 1. uge af juni.

Det oplyses i PlanteNyt 597.

Alle afgrøder angribes, og der er pt. ingen muligheder for kemisk bekæmpelse.

Erfaringerne viser, at ærter og majs er lidt mere robuste end de øvrige afgrøder. I majs har udsæd bejdset med specialbejdsemidler en del effekt, men udbuddet af sorter og den tilbageværende mængde udsæd er meget begrænset.

kl

