



**VIDENCENTRET FOR LANDBRUG**

Økologi

# **Rodukrudtsdag den 4. oktober 2013**

**Lars Egelund Olsen og Inger Bertelsen**



Ministeriet for Fødevarer,  
Landbrug og Fiskeri




Den Europæiske  
Landbrugsfond for Udvikling  
af Landdistrikterne



Naturerhverv.dk



Danmark og EU investerer i landdistrikterne.



## **Eksempler på strategier, der har virket**

### **Kvik**

- Harvning hele året, når forholdene er gode for udsultning eller udtørring
- Minisommerbrak

### **Agertidsler**

- Afpudsning af kløvergræsmarker
- Dobbeltpløjning med god efterafgrøde
- Forårspøjning, eller så sent som jordtypen tillader
- Minisommerbrak

### **Agersvinemælk**

- Gennemskærende behandling lige efter høst + efterafgrøde
- Begræns jordbearbejdning i efteråret
- Jordbearbejdning tidlig forår
- Minisommerbrak

### **Følfod**

- Toårig indsats er nødvendig
- Findel evt. udløberne lige efter høst
- Dobbeltpløjning med god efterafgrøde
- Tidlig forårsindsat – når knopperne er lige ved at bryde jorden
- Minisommerbrak

### **Du skal altid have fokus på;**

- Stop væksten efter høst
- Fuld gennemskæring – for at stoppe væksten
- Konkurrencestærke afgrøder
- God pløjning

## Dilemmaer ved en blandet bestand

Læg vægt på den mest problematiske og undgå opformering af andre arter


	Udtørring	Udsultning	Gennemskæring efter høst	Dobbeltpløjning med efterafgrøder	Jordbearbejdning september - oktober	Jordbearbejdning december – marts	Forårspløjning	Afpudsninger i kløvergræs	Minisommerbrak
Kvik	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😞	😞	😊
Agertidsler	😞	😊	😊	😊	😞	😞	😊	😊	😊
Agersvinemælk	😞	😊	😊	😞	😞	😊	😊	😊	😊
Følfod	😞	😊	😊	😊	😞	😊	😊	😊	😊



## Minisommerbrak – når der er brug for oprydning

Minisommerbrak kan anvendes i marker, hvor rodukruddt har taget overhånd, har effekt på alle rodukruddtsarter.

### Minisommerbrak – effekt



### Sådan gør du

Efter høst – når der er agersvinemælk, agertidse og følfod (men ikke, hvis der kun er kvik)

- Pløj umiddelbart efter høst og etabler afgrøde der kan høstes i maj/juni eller en efterafgrøde
- Er der en efterafgrøde etableres der er grønafgrøde i foråret efter pløjning

Minisommerbrak gennemføres juni til august

- Høst grønafgrøden medio juni
- Fuld gennemskæring, skrælpøjning eller vingeskærsharve
- Rødder og udløbere skal op ovenpå jorden
- Harv med 7 – 10 dages mellemrum
- Pløj sidst i juli/først i august
- Etabler en efterafgrøde
- Pløj næste forår og så en konkurrencestærk afgrøde