

Beregning af huldtab siden goldning- definition



Ændringer

Opg.	Dato	Beskrivelse
10882	11/10 2012	Oprettet
10882	20-11-2012	Øvre alarmgrænse anvendes ikke mere. KPI'en bruges kun som målsætning

Faglig beskrivelse af Nøgletal/KPI

Angiver det gennemsnitlige huldtab siden goldning for en DE.

Huldudvikling siden goldning beregnes som (Huld indberettet efter kælving) minus (Huld indberettet ved goldning) = hulduvikling. Et huldtab i goldperioden vil dermed blive angivet som en værdi med negativt fortegn.

Kun køer med huldvurdering både ved goldning og ved kælving indgår i beregningen.

Huld indberettet ved kælving findes som den første kliniske registrering 0-19 dage efter registreret kælvningsdato.

Huld indberettet ved goldning findes som den seneste kliniske registrering 21-120 dage inden registreret kælvningsdato.

Der anvendes kun data for køer - ikke for kvier.

Huldtabet er registreret den dato, hvor dyret er hulddregistreret efter kælving.

Ved flere huldvurderinger, der opfylder kriterierne, anvendes målingerne tættest muligt på kælvingstidspunktet. Nedenstående figur viser hvilken huldvurdering, der er anvendt i beregningen.

- Huldvurdering, der opfylder kriteriet
- Huldvurdering, der anvendes til fede goldkøer og huldtab



Opnået værdi

Den opnåede værdi beregnes som gennemsnitligt huldudvikling, for de køer, der har angivet en værdi.

[#165 – Huldudvikling i goldperiode; Aktuel DE]

[#165 – Huldudvikling i goldperiode] findes i Measure Group "hldHuldvurdering"

Målværdi

{KPI#17 - Huldtab siden goldning, Maks acceptabelt; Målværdi}

Øvre alarmgrænse

Anvendes ikke

Nedre alarmgrænse

Anvendes ikke

Status

Ingen tolkning

Opdateret

Anvendes ikke