



Angreb af fritfluellarver i rug

Der er ingen muligheder for bekæmpelse på nuværende tidspunkt.

Den sidste uges tid er der modtaget flere henvendelser om angreb af fritfluellarver i rug. Anden vintersæd kan også angribes. De angrebne planter gulner og visner i hjerteskuddet kort efter fremspiring, og bladet kan let rykkes af. Kigger man ved stængelbasis og folder bladskeuderne fra hinanden, fremkommer den 3-4 mm lange hvidlige til gullige larve. Foran på larven ses to sorte mundkroge. Se foto 1-2. I flere marker er der tale om ret kraftige angreb.

Fritfluens 3. generation flyver fra slutningen af august til hen i september. Fritfluerne kan skade ved at ligge æg direkte i vintersæden i 1,5-2 bladstadiet eller ved at ligge æg på spildkornplanter og græsukrudt i stubben efter forfrugten. Planter med 1,5-3 blade er attraktive for æglægning, mens der ikke lægges æg på ældre planter. Ved pløjning af stubben bevæger larverne sig så op i den nyfremspirende vintersæd. I marker med angreb i år vurderes det, at der er lagt æg på spildkornplanter og græs i stubben af forfrugten. Mange enkimbladede planter i stubben af forfrugten giver de bedste æglægningsmuligheder. Betydende angreb af fritfluere er dog sjældne, og det varme vejr i år vurderes at have givet gode betingelser for æglægning på spildkorn og græs i stubben efter forfrugten. Tidligere er også set et eksempel på, at der blev afbrændt enkelte mislykkede halmballer i stubben efter forfrugten, og kun i dette område af marken kom der ikke angreb af fritfluere i den efterfølgende vintersæd.

Der er ingen muligheder for bekæmpelse af angreb i vintersæden på nuværende tidspunkt. Bekæmpelse i stubben efter forfrugten er også tvivlsom, da det er svært at ramme det rigtige tidspunkt, ligesom angreb er for sjældne til, at man vil udføre en sådan bekæmpelse.

Ved omsåning med vintersæd kan der være risiko for angreb fra flere larver i jorden. Hvor langt larverne er i udvikling, er svært at sige, da tidspunktet for flyvningen af de 3 generationer kan variere meget. Det kan måske være aktuelt at udsætte såningen lidt. Overvintring sker som larve i angrebne planter.



Billede 1. Angreben rugplante og 2 fritfluellarver, som er fundet i stængelbasis af 2 planter.



Billede 2. Nærbillede af fritfluellarver.

Kontakt din **lokale rådgivningsvirksomhed**, hvis du vil vide mere om dette emne.

Promilleafgiftsfonden for landbrug

