

Hjem > [Promilleafgiftsfonden](#) > [2013](#) > [Formidling og demo af ny viden](#) > **Der er majsøjeplet i flere majsmarker**

Der er majsøjeplet i flere majsmarker

I marker med mere udbredte angreb anbefales bekæmpelse, fra at majsene er omkring 1 meter høj.

Følg udviklingen af svampesygdomme i majs i [registreringsnettet for bladsvampe](#) i majs, der er startet 8.-9. juli. Det fremgår, at der findes meget majsøjeplet i flere marker med reduceret jordbearbejdning og samtidig forfrugt majs. I pløjede marker findes også angreb, men på et væsentligt lavere niveau.

Det tidligere fugtige vejr har fremmet majsøjeplet, der trives bedst ved nedbør og 24 °C og har en inkubationstid (tid fra smitte til symptomer ses) på ca. 10 dage.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'

Bekæmpelse

Svampebekæmpelse i majs anbefales i to tilfælde:

- Alle "risikomarker" sprøjtes, dvs. majsmarker med forfrugt majs og samtidig reduceret jordbearbejdning.
- Alle marker med mere udbredte angreb sprøjtes uanset dyrkningsteknik. Nogen bekæmpelsestærskel er ikke kendt, men tærsklen vurderes at ligge omkring 5-10 procent angrebne planter.

Sprøjtetidspunkt

Svampebekæmpelse er tilladt indtil vækststadium 65 (fuld blomstring), dvs. til omkring 1. august.


Ved bekæmpelsesbehov vil der i de fleste tilfælde kunne sættes på 1 behandling omkring perioden st. 51-65 (hanblomsterstand mærkbar til fuld blomstring) med omkring 0,7 l Opera. Ved tidlige og mere udbredte angreb anbefales det dog at fremskynde behandlingen, da den bedste effekt af svampesprøjtning opnås ved at bekæmpe svage angreb. I disse tilfælde anbefales en behandling med 0,5 l Opera, når afgrøden er omkring 1 meter høj, og behandlingen gentages 2 uger senere. Ved meget kraftige angreb ved første sprøjtning hæves dosis til 0,7 l Opera.

Se også [plantenyt nr. 852, 2013](#).



Billede 1. Angreb af majsøjeplet på bladene i majsmark i registreringsnettet med forfrugt majs og pløjefri dyrkning fotograferet 5. juli. Omkring 75 procent af planterne var angrebne. Ved første øjekast kan det måske ligne en svindning, men holdes bladene op mod lyset ses de brune cirkulære pletter, som er omgivet af en gul rand.

Foto: Hans Kristian Skovrup, Sønderjysk Landboforening.



Billede 2-3. Majsøjeplet på begge fotos. Det samme blad er fotograferet 2 gange.

Foto 2 er fotograferet, mens bladet ligger på jorden.

Foto 3 er fotograferet, mens bladet er holdt op mod lyset.

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.