



Hjem > [Promilleafgiftsfonden](#) > 2013 > [Formidling og demo af ny viden](#) > **Handelsgødning til vårsæd**

Handelsgødning til vårsæd

Den bedste gødningseffekt fås ved placering af handelsgødning ved såning, mens den dårligste effekt fås af udbringning på jordoverfladen efter såning.

Ved udbringning af gødning til vårsæd kan vælges forskellige teknikker og tidspunkter. I tabellen er mulighederne listet efter deres effekt:

Placering ved såning	Placering 5 cm ved siden af og under kernen giver en sikker gødningseffekt hvert år. Normalt opnås et merudbytte på 1 til 3 hkg i forhold til nedharvning før såning. Merprisen for gødningsplacering er for maskinstationer ca. 100 kr. pr. ha og derfor rentabel.
Nedfældning	Gødningen nedfældes til 6-8 cm's dybde før eller i forbindelse med såning. Dette er næsten lige så godt som placering.
Nedharvning før såning	Metoden er generelt dårligere end placering, men bedre end udspredding uden nedharvning og/eller efter såning.
Udspredding efter såning	Den dårligste af de skitserede løsninger.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Se 'European Agricultural Fund for Rural Development'

Ved placering af gødning ved såning fås desuden mindre manganmangel og generelt en lettere ukrudtsbekæmpelse.

Blanding af gødning og udsæd

Har man ikke placeringsudstyr på såmaskinen, kan man blande en vis mængde gødning i udsæden. Det rummer imidlertid altid en risiko for spiringsskader. Ud fra de erfaringer, der løbende er gjort med samsåning af korn og gødning, synes det rimeligt at anvende op til 50 kg kvælstof pr. ha i en ammoniumnitratbaseret gødning. Derimod er der stor risiko ved at anvende urea til samsåning med korn. Fosfor kan tilføres som mono-, di- eller triplefosfat som samsåning med korn op til en fosformængde på 20-25 kg pr. ha. Almindelige kaliumkloridgødninger bør ikke anvendes til samsåning.

Se uddybende forklaring om [samsåning af gødning og korn](#).

Delt gødsning

På JB1 og JB3 kan der i nedbørsrige forår ske en udvaskning fra rodzonen efter udspredding af gødningen. På vandede arealer bør gødningstilførslen deles, så der kun tildeles op til 60 kg kvælstof pr. ha før såning. Resten kan udspreddes i slutningen af maj - evt. af flere gange. Alternativt kan hele mængden udbringes i flydende ammoniak eller i en placeret DAN-gødning eller anden ammonium- eller amidbaseret gødning. På lerjord anbefales generelt at tildele hele kvælstofmængden på én gang.

Læs mere om [gylle til vårsæd](#)

Se også vejledningen "[Udbringning af handelsgødning](#)".

Kontakt din **lokale rådgivningsvirksomhed**, hvis du vil vide mere om dette emne.